Contribuidores de Datos del SWOT

Definición de Términos

Nidos: un conteo del número de nidos puestos por hembras de tortuga carey durante el período de monitorización.

Hembras anidadoras: un conteo de las hembras carey observadas en anidación durante el período de monitorización.

Rastro: la aparición o salida de una hembra carey sobre la playa para anidar. Estos conteos pueden o nó incluir rastros falsos.

Rastros Falsos: una aparición o salida a la playa por una hembra carey que no resulta en un nido.

Nidos calculados: un cálculo aproximado del número de nidos de tortuga carey puestos durante una temporada. Los métodos de cálculo varían.

Esfuerzo de Monitorización: nivel de esfuerzo utilizado para monitorizar la anidación en una playa dada.

Año: el año en el cual la temporada de anidación dada terminó (p.ej. los datos recolectados entre finales del 2005 y comienzos del 2006 aparecen citados como pertenecientes al año 2006).

Citas de Datos sobre las Tortugas Carey

Directrices para el Uso y la Cita de Datos

Los datos sobre la anidación de las tortugas carey a continuación corresponden directamente al mapa principal de este reporte (pp. 12–13) organizado alfabéticamente por país y nombre de playa. Cada registro de datos son un punto en el mapa ha sido numerado para que corresponda con ese punto. Estos datos han sido suministrados por una gran variedad de fuentes y en muchos casos no habían sido publicados previamente. Los datos pueden ser utilizados libremente pero tienen que ser citados con la fuente original como se indica en el espacio de "Fuente de Datos" de cada registro. Aquí se reportan solamente datos originales, no los valores convertidos que fueron utilizados algunas veces en el mapa principal. Para recibir mayor información sobre las conversiones de datos por favor refiérase a la barra en el margen de la p.11.

En los registros dados a continuación los datos de la anidación son reportados sobre la última temporada de anidación completa en el 2006 de todas las playas disponibles. Para aquellas playas donde los datos recientes no se encuentran disponibles, se han reportado los datos más recientes que si lo están.

Nota Importante sobre los Datos de las Carey

Se ha hecho un gran esfuerzo en suministrar información suficiente para cada registro de datos con el fin de permitir que la calidad y la fuente del registro sean justamente evaluadas. Si bien se ha hecho todo esfuerzo para asegurar la precisión de esos datos, no se puede garantizar una absoluta precisión. La información sobre el esfuerzo de monitorización y su relatividad con respecto a la temporada de anidación ha sido reportada donde se ha encontrado disponible con el fin de proporcionar una evaluación más completa de los datos.

ANGUILA, TERRITORIO BRITÁNICO DE ULTRAMAR

Registro de Datos 1

Fuente de Datos: Gumbs, J. 2008. Hawksbill nesting in Anguilla: Personal Communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Punta Windward, Bahía Savannah, Bahía Junk's Hole, Bahía Mimi, Bahía Sandy Hill, Bahía Cove, Banco Bay East, Bahía Barnes, Bahía Mead's, Bahía Larga, Bahía Caliza.
Año: 2006 **Conteo:** se calcula entre 1 y 5 nidos en cada una

Playas de Anidación: Bahía del Capitán y Bahía Blackgarden
Año: 2006 **Conteo:** se calcula entre 5 y 10 nidos en cada una.
Comentarios: En la actualidad no existe un programa de monitorización en Anguila. Los números referentes a la anidación son promedios anuales aproximados basados en datos históricos.
Contacto SWOT: James Gumbs

ANTIGUA Y BARBUDA

Registro de Datos 2

Fuente de Datos: Munhofen, J., and S. Ramirez. 2007. *Tagging and Nesting Research on Hawksbill Turtles (Eretmochelys imbricata) at Jumby Bay, Long Island, Antigua, West Indies.* Jumby Bay Hawksbill Project, WIDECAST. Unpublished Report.
Playa de Anidación: Pasture Bay
Año: 2006 **Conteo:** 224 nidos, 62 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 450 m
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos realizados diariamente con una cobertura total de la playa fueron llevados a cabo entre el 15 de junio y el 15 de noviembre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar desde junio hasta mediados de noviembre con su apogeo en agosto.
Contactos SWOT: Peri Mason y Jim Richardson

ARUBA

Registro de Datos 3

Fuentes de Datos: Van der Wal, E., and R. Van der Wal, Turtugaruba (Aruban Foundation for Sea Turtle Protection and Conservation). 2008. Hawksbill nesting in Aruba. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Arashi
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 0.6 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes diarios realizados cada mañana con una cobertura total de playa fueron llevados a cabo entre el 1ro. de junio y el 15 de octubre del 2006. Aunque no se registró anidación de tortuga carey durante el 2006, se sabe que la carey ha anidado en este sitio en años anteriores. La temporada de anidación es de junio a noviembre.

Playa de Anidación: Baby Beach
Año: 2006 **Conteo:** 5 nidos **Longitud de la Playa:** 100 m
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos realizados diariamente con una cobertura total de la playa fueron llevados a cabo entre el 1ro. de agosto del 2006 y el 20 de enero del 2007. La temporada de anidación es de junio a noviembre, con su apogeo en septiembre y octubre.
Contactos SWOT: Edith and Richard Van der Wal

AUSTRALIA

Registro de Datos 4

Fuente de Datos: Limpus, C. J., and J. D. Miller. 2000. *Final Report for Australian Hawksbill Turtle Population Dynamics Project.* Queensland, Australia: Queensland Parks and Wildlife Service, and the Japan Bekko Association.
Playas de Anidación: Isla Albany, Isla Aukane, Isla Bet, Isla Bourke, Isla Boydong, Isla Dadalai, Isla Layoak, Isla Mimi, Isla Mt. Adolphus, Isla Saddle, Isla Zuizin, y una isla sin nombre, Queensland.
Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Reconocimientos aéreos combinados con conteos terrestres en febrero de 1997 hallaron que estas doce islas en el Estrecho Torres y Queensland nororiental recibían la anidación de 100 a 500 tortugas carey anualmente. Se halló que 28 islas adicionales en esta región recibían un número aproximado entre 10 y 100 tortugas carey por año, y otras 27 islas recibían un número aproximado entre 1 y 10 tortugas carey anidadoras anualmente. Limpus y Miller (2000) calcularon que la población anidadora total en Queensland era de aproximadamente 4,000 hembras anidadoras por año.

Playas de Anidación: Isla Dayman, Isla Hawkesbury, Isla Long, Estrecho Torres, Queensland
Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Reconocimientos aéreos combinados con conteos terrestres en febrero de 1997 halló que estas tres islas recibían cada una la anidación de más de 500 tortugas carey anualmente.

Playas de anidación: Islas Periféricas de la Compañía Inglesa y las áreas nororiental, noroccidental y suroriental de Groote Eylandt y las islas cercanas, Tierra Nororiental Arnhem, Territorio del Norte.
Comentarios: Los datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Reconocimientos aéreos combinados con conteos terrestres en febrero de 1997 documentaron 12 sitios en Tierra Nororiental Arnhem donde se calcula que cada uno recibe la anidación de más de 100 tortugas carey anualmente. Las anidación en estas playas se concentra en las cuatro áreas generales mencionadas anteriormente: Islas Periféricas de la Compañía Inglesa, el área nororiental de la Isla Groote Eylandt, el área noroccidental de la Isla Groote Eylandt, y el área suroriental de la Isla Groote Eylandt.

Registro de Datos 5

Fuente de Datos: Pendoley, K., Howitt, L., Speirs, M., and A. Vitern¬bergs. 2008. Hawksbill nesting in Western Australia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Bivalve, Pilbara, Australia Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 1 hembra marcada
Longitud de la Playa: 0.6 km

Playa de Anidación: Playa Mushroom, Pilbara, Australia Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 1.2 km

Playa de Anidación: YCN, Pilbara, Australia Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 1.1 km

Playa de Anidación: YCS, Pilbara, Australia Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 2 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos fueron llevados a cabo diariamente en cada una de las playas meciona-

das anteriormente desde el 22 de noviembre al 21de diciembre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar entre septiembre y diciembre, con su apogeo entre octubre y noviembre.

Playa de Anidación: Isla Rosemary, Australia Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 423 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 2.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron llevados a cabo diariamente desde el 13 al 27 de octubre del 2006. La temporada de anidación ocurre entre septiembre y diciembre con su apogeo entre octubre y noviembre.

Playa de Anidación: Isla Varanus, Australia Occidental.
Año: 2006 **Conteo:** 22 hembras marcadas
Longitud de la Playa: 320 m
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron realizados diariamente entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre del 2006. La temporada de anidación ocurre entre septiembre y diciembre, con su apogeo entre octubre y noviembre.
Contacto SWOT: Kellie Pendoley

Registro de Datos 6
Fuente de Datos: Bell, I. P. 2006. *Milman Island Nesting Studies 8th to 29th January 2006.* Queensland Parks and Wildlife Service.
Playas de Anidación: Isla Cairncross, Isla Cocodrilo, Isla Douglas, e Isla Sinclair, Queensland
Comentarios: Estas islas, cerca a la Isla Milman, no fueron monitorizadas durante el 2006 pero se sabe que reciben una desidad baja de anidación por parte de la tortuga carey.
Playa de Anidación: Isla Milman, Queensland
Año: 2006 **Conteo:** 229 nidos confirmados, 112 hembras anidadoras **Longitud de la Playa:** 2.4 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos fueron realizados diariamente entre el 8 de enero y el 29 de enero del 2006. Estos conteos deben ser considerados como valores mínimos; la temporada de anidación ya se encontraba muy avanzada antes de iniciar el período de monitorización.
Contactos SWOT: Ian Bell, Kirstin Dobbs, and Colin Limpus

LAS BAHAMAS
Registro de Datos 7
Fuente de Datos: (1) Bolten, A. 2008. Hawksbill nesting in Bahamas: Comunicación personal. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008). (2) Mortimer, J. A., and M. Donnelly. Forthcoming. *Eretmochelys imbricata.* In IUCN2008, *2008 IUCN Red List of Threatened Species.*
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no fueron disponibles. Existe una anidación de baja densidad dispersa en los aproximadamente 700 cayos que integran las Bahamas. Aunque no existe monitorización, cálculos muy aproximados ubican entre 500 y 1,000 nidos de carey anualmente por todo el archipiélago de las Bahamas.
Contactos SWOT: Karen Bjorndal and Alan Bolten

BARBADOS
Registro de datos 8
Fuente de Datos: Horrocks, J., Krueger, B., and J. Beggs. 2008. Hawksbill nesting in Barbados. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Bath
Año: 2006 **Conteo:** 102 nidos **Longitud de la Playa:** 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa es patrullada cada mañana durante todo el año. El apogeo de la anidación ocurre entre mayo y septiembre.

Playa de Anidación: Playas de la Costa Oriental
Año: 2006 **Conteo:** 59 nidos **Longitud de la Playa:** 9 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron patrulladas semanalmente entre el 1ro. de marzo y el 31 de julio del 2006. El apogeo de la anidación ocurre entre marzo y julio.

Playa de Anidación: Playa Needham's Point
Año: 2006 **Conteo:** 354 nidos **Longitud de la Playa:** 1.1 km
Esfuerzo de monitorización: En su calidad de playa índice, Needham's Point fue patrullada toda la noche, cada noche de mayo a septiembre; dos veces por noche entre octubre y noviembre; y una vez a la semana de diciembre finales a abril. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo en mayo y septiembre.

Playa de Anidación: Playas de la Costa Sur
Año: 2006 **Conteo:** 261 nidos
Longitud de la Playa: 4.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Las Playas de la Costa Sur fueron patrulladas dos veces cada noche durante el apogeo de la anidación desde de mayo a septiembre, cada noche de octubre a noviembre y una vez por semana desde diciembre hasta abril.

Playa de Anidación: Playas de la Costa Occidental
Año: 2006 **Conteo:** 1,044 nidos **Longitud de la Playa:** 22 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas de la Costa Occidental fueron patrulladas dos veces cada noche durante el apogeo de la temporada de anidación de mayo a septiembre, y cada noche entre octubre y noviembre y una vez a la semana de diciembre a abril.
Contactos SWOT: Jen Beggs, Julia Horrocks, y Barry Krueger

BELICE
Registro de Datos 9
Fuente de Datos: (1) Dow, W. E., and K. L. Eckert. 2007. *Sea Turtle Nesting Habitat—A Spatial Database for the Wider Caribbean Region.* Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST) and The Nature Conservancy. WIDECAST Technical Report No. 6. Beaufort, North Carolina. (2) Mortimer, J. A., and M. Donnelly. Forthcoming. *Eretmochelys imbricata.* In IUCN 2008, *2008 IUCN Red List of Threatened Species.* (3) Smith, G. W. 1992. Hawksbill turtle nesting at Manatee Bar, Belize, 1991. *Marine Turtle Newsletter* 57:1–5.
Playas de Anidación: Barra Manatee, Cayos Sapodilla, y Cayo South Water
Comentarios: Datos sobre la anidación del 2006 no fueron disponibles. Se sabe que estas áreas mantienen anidación de tortugas carey.

BRASIL
Registro de Datos 10
Fuente de Datos: Marcovaldi, M., Soares, L., and C. Bellini. 2008. Hawksbill nesting in Brazil. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Abaís, Pirambu, y Ponta dos Mangues, Estado de Sergipe
Año: 2006 **Conteo:** 118 nidos **Longitud de la Playa:** 125 km

Playas de Anidación: Arembepe, Praia do Forte, Costa do Sauipe, y Sitio do Conde, Estado de Bahía
Año: 2006 **Conteo:** 1,159 nidos
Longitud de la Playa: 213 km

Playas de Anidación: Pipa, Estado Rio Grande do Norte
Año: 2006 **Conteo:** 240 nidos **Longitud de la Playa:** 9 km
Esfuerzo de Monitorización: En todas las playas mencionadas anteriormente, se patrulló la playa completa diariamente día y noche desde el 1ro. de septiembre del 2005, a marzo 31 del 2006. La temporada de anidación ocurre desde principios de septiembre a finales de marzo, con su apogeo de diciembre a febrero.
Contactos SWOT: Claudio Bellini, Maria A. Marcovaldi, and Luciano Soares

CAMERÚN
Registro de Datos 11
Fuente de Datos: CEROCOMA y PROTOMAC. *Rapport des Activités.* Cameroon, Central Africa. Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas al sur del pueblo de Kribi
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos
Esfuerzo de monitorización: La playa completa fue patrullada diariamente desde el 11 de septiembre del 2005 hasta el 30 de abril del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de septiembre a abril.
Contactos SWOT: Alain Gibudi y Jules Ngunguim

ISLAS CAIMÁN, TERRITORIOS BRITÁNICOS DE ULTRAMAR
Registro de Datos 12
Fuente de Datos: Solomon, J., and J. Blumenthal. *Cayman Islands Government, Department of Environment Annual Marine Turtle Beach Monitoring Program 2006.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Frank Sound, Grand Cayman
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos **Longitud de la Playa:** 1.43 km

Playa de Anidación: Seven Mile Beach, Grand Cayman
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 8.83 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada dos veces por semana desde el 28 de abril al 28 de septiembre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar desde comienzos de mayo a mediados de julio, con su apogeo de mayo a julio.
Contactos SWOT: Joni Solomon y Janice Blumenthal

ARCHIPIÉLAGO DE CHAGOS, TERRITORIOS BRITÁNICOS DE ULTRAMAR
Registro de Datos 13
Fuente de Datos: Mortimer, J. A., and M. Day. 1999. Sea turtle populations and habitats in the Chagos Archipelago. In C. R. C. Sheppard and M. R. D. Seaward, eds, 1999, *Ecology of the Chagos Archipelago,* Linnean Society Occasional Publications 2.

El Grupo de Interés Especial en Cartografía del Instituto de Sistemas de Investigaciones Ambientales ha otorgado a la coordinadora de mapas del SWOT, Kellee Koening de Conservación Internacional, un premio por el mapa desplegado en el *SWOT Report II* "Los Sitios de Anidación a Nivel Mundial de la Tortuga Caguama en el 2005". El mapa fue seleccionado entre más de 500 otros trabajos

Playas de Anidación: Archipiélago de Chagos
Comentarios: Datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Se calcula que anualmente el Archipiélago de Chagos recibe entre 300 y 700 nidos de tortuga carey. La anidación más abundante ocurre en las islas Peros Banhos y Diego García.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

CHINA
Registro de Datos 14
Fuente de Datos: (1) Cheng, I. J. 1995. Sea turtles at Dungsha Tao, South China Sea. *Marine Turtle Newsletter* 70:13–14. (2) Cheng, I. J. 1996. Sea turtles at Taipin Tao, South China Sea. Marine Turtle Newsletter 75: 6–8. (3) Liang, Y. L., Dai, Y. R., Liu, Y. Q., Liu, S. Y., Wan, X. J., Song, Z. H., Chen, D. T., et al. 1990. The investigation of sea turtle resources in the South China Sea and the development of artificial hatching techniques for sea turtles. *In Report of the South China Sea Turtle Resources Conservation Station,* Major Research Project of the Aquaculture Department. China: Bureau of Agriculture.
Playa de Anidación: Donsha, Taiwan
Comentarios: Datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. El último registro sobre la anidación data de 1995 cuando cinco nidos y rastros de anidación fueron hallados durante pesquisas nocturnas. La temporada de anidación ocurre entre mayo y octubre.

Playa de Anidación: Qilianyu, Archipiélago Xhisha
Comentarios: Datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan sobre esta playa en números limitados.

Playa de Anidación: Taipin Tao, Nan-sha Archipiélago, Taiwán
Comments: Esta es una isla controlada por las fuerzas militares y los datos sobre la anidación no se encuentran disponibles. Los estudios llevados a cabo en 1996 hallaron que las tortugas carey anidan en estas playas.
Contacto SWOT: I-Jiunn Cheng

COLOMBIA
Registro de Datos 15
Fuente de Datos: Patiño-Martinez, J., and L. Quiñones. 2008. Hawksbill nesting in Colombia: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Acandí-Chilingos, Capitancito, Playona, Playeta, y Pueblo Nuevo
Comentarios: Cada una de estas playas alberga anidación de la tortuga carey en números desconocidos, la cual se inicia en mayo y termina en una fecha indeterminada. Esta información fue determinada por medio de conteos de rastros y entrevistas con los residentes locales.
Contactos SWOT: Juan Patiño Martinez y Liliana Quiñones

Registro de Datos 16
Fuente de datos: Pavia, A., and C. Monterrosa. 2008. Hawksbill nesting in Tayrona National Park, Colombia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Arrecifes, Parque Nacional Tayrona, Magdalena
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos, 11 rastros
Longitud de la Playa: 2.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada diariamente desde abril a septiembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a septiembre con su apogeo en julio y agosto.
Contactos SWOT: Carolina Monterrosa y Alejandro Pavia

COSTA RICA
Registro de Datos 17
Fuente de Datos: Gaos, A. R., Yañez, I. L., and R. M. Arauz. 2006. *Sea Turtle Conservation and Research on the Pacific Coast*

of Costa Rica. Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA). Technical report.
Playa de Anidación: Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos **Longitud de la Playa:** 5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada cada noche desde el 1ro. de julio del 2005 hasta marzo 31 del 2006.
Contactos SWOT: Alexander Gaos e Ingrid Yáñez

Registro de Datos 18
Fuente de Datos: Hutchinson, A. 2008. Hawksbill nesting on Playa Camaronal, Costa Rica: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal
Comentarios: Datos sobre la anidación en el 2006 no fueron disponibles. Se sabe que Camaronal alberga la anidación esporádica de uno o dos nidos por año de tortugas carey.
Contacto SWOT: Alec Hutchinson

Registro de Datos 19
Fuente de Datos: Chacón-Chaverrí, D. 2008. Hawksbill nesting in Costa Rica: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles, v*ol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Uvita, Limón
Año: 2006 **Conteo:** 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Cahuita
Año: 2006 **Conteo:** 25–75 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Gandoca
Año: 2006 **Conteo:** 15–25 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Pacuare
Año: 2006 **Conteo:** 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: Playa Platanares, Península Osa
Año: 2006 **Conteo:** 1–3 nidos por año

Playa de Anidación: Parque Nacional Manuel Antonio
Año: 2006 **Conteo:** 1–2 nidos por año

Playa de Anidación: Rio Oro, Península
Año: 2006 **Conteo:** se calcula 1 nido por año

Playa de Anidación: Punta India hasta Rayo, Guanacaste
Año: 2006 **Conteo:** 1–2 nidos por año
Comentarios: El litoral del Pacífico de Costa Rica recibe la anidación esporádica de tortuga carey.
Contacto SWOT: Didiher Chacón

Registro de Datos 20
Fuente de Datos: Piedra, R. 2008. Hawksbill nesting on Playa Langosta, Costa Rica: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Langosta, Parque Nacional Marino Las Baulas, Guanacaste
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 1.3 km
Comentarios: Los nidos de tortuga carey registrados más recientemente sobre Playa Langosta fueron anotados en el 2003, cuando dos nidos fueron hallados.
Contacto SWOT: Rotney Piedra

Registro de Datos 21
Fuente de Datos: Venegas, R. 2006. *Report of Activities and Research in Pacuare Reserve, 2006 Season.* Pacuare Reserve Marine Turtle Conservation Project, Playa Mondonguillo. Endangered Wildlife Trust. Unpublished report.
Nesting Beach: Playa Mondonguillo, Provincia de Limón
Año: 2006 **Conteo:** 2 nidos, 5 hembras anidadoras.
Longitud de la Playa: 5.7 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada durante el dia y la noche diariamente desde el 28 de febrero al 30 de septiembre del 2006.
Contacto SWOT: Rubén Venegas

Registro de Datos 22
Fuente de Datos: Castro-Morales, C., and F. Campos-Rodriguez. 2006. *Final Report: Research and Protection of the Leatherback, Green and Hawksbill Turtles of the Parismina River Mouth.* Asociación Salvemos Las Tortugas de Parismina. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Parismina, Provincia de Limón
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 5.6 km
Esfuerzo de Minitorización: La playa completa fue patrullada cada noche desde febrero 15 a octubre 15 del 2006. La temporada de anidación es de mayo a agosto.
Contacto SWOT: Vicky Taylor

Registro de Datos 23
Fuente de Data: De Haro, A., et al. 2007. *Report on the 2006 Green Turtle Program at Tortuguero, Costa Rica.* Caribbean Conservation Corporation. Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero
Año: 2006 **Conteo:** 14 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 29 km
Esfuerzo de Monitorización: Aproximadamente 8.0–14.5 kilómetros de playa fueron patrullados cada noche desde el 5 de marzo al 31 de octubre del 2006. La temporada de anidación se extiende de abril a noviembre con su apogeo de mayo a julio.
Contacto SWOT: Emma Harrison

COSTA DE MARFIL
Registro de datos 24
Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa.* CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program/Convention on Migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Playas de Balmar y Many-Dodo
Comentarios: Los pescadores locales reportan la anidación de la tortuga carey en estas playas. Se desconocen los números con respecto a la anidación y se cree que son bajos.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

CUBA
Registro de Datos 25
Fuente de Datos: (1) Moncada, F., Carrillo, E., Saenz, A., and G. Nodarse. 1999. Reproduction and nesting of hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata,* in the Cuban Archipelago. *Chelonian Conservation and Biology,* vol. 3, no. 2 (1999). (2) Moncada, F., Nodarse, G., Medina, Y., and E. Escobar. 2006. *Annual Report on Hawksbill Turtle* (Eretmochelys imbricata) *Research in Cuba (February 2006–February 2007).* Cuba: Marine Turtle Project, Fisheries Research Center. (3) Moncada, F. 2008. Hawksbill nesting in Cuba: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Playas del Laberinto de las Doce Leguas, Provincias de Camaguey y Ciego de Ávila
Año: 2006 **Conteo:** 120 nidos
Longitud de la Playa: 37.71 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos llevados a cabo diariamente fueron realizados entre el 1ro. de octubre del 2006 al 31 de enero del 2007. La temporada de anidación ocurre de octubre a enero con su apogeo en noviembre
Comentarios: Las tortugas carey anidan por todo el archipiélago cubano en muchos sitios donde la monitorización no es posible. Los cálculos previos sobre la anidación anual se ubican entre 2,000 y 2,500 nidos por año en toda Cuba. Sin embargo, estos cálculos no son actualizados y pueden ameritar una revisión.
Contacto SWOT: Félix Moncada

DOMINICA
Registro de Datos 26
Fuente de datos: Byrne, R. 2008. Hawksbill nesting in Dominica: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Bahía Bodega, Playa Cabana/Londonderry, Playa Hamstead, Playa Marigot, y Woodford Hill
Año: 2006 **Conteo:** 10–15 nidos por año en cada playa
Longitud de la Playa: Cada playa mide menos de 1 km de largo con la excepción de Playa Cabana Beach/Londonderry, la cual mide un poco menos de 3 km.

Playas de Anidación: Playa Castaways, Castle Bruce, Playa Donkey, Playa La Plaine-Bout Sable, Playa Maho, Playa Massace, Petit Soufiere, Point Michele, Pottersville Roseau, Playa Rockaway, Playa Rosalie, Scotts Head, y Soufiere
Año: 2006 **Conteo:** 1–5 nidos por año en cada playa

Playas de Anidación: Playa Dublanc, Playa Macousirie, Playa Portsmouth, Playa Salisbury, y Playa Toucarie
Año: 2006 **Conteo:** 5–10 nidos por año en cada playa
Contacto SWOT: Rowan Byrne

DOMINICAN REPUBLIC
Data Record 27
Fuente de Datos: Tomás, J., León, Y. M., Feliz, P., Geraldes, F. X., Broderick, A. C., Fernández, M., Godley, B. J., and J. A. Raga. 2007. Sea turtle nesting populations of the Dominican Republic. In *14th European Congress of Herpetology, Porto (Portugal),* 19–23 September 2007. Book of abstracts.
Playa de Anidación: Parque Nacional Jaragua
Año: 2006 **Conteo:** 23 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Los datos fueron recolectados durante intensivos estudios y entrevistas durante el 2006. Estas indagaciones constituyen los primeros estudios sistemáticos sobre la anidación de la tortuga carey en la República Dominicana en más de 25 años. La temporada de anidación es de julio a noviembre.
Comentarios: Se observó que la toma ilegal de huevos en este sitio llega casi al 100 por ciento.

Playa de Anidación: Isla Saona, Parque Nacional Oriente East National Park
Año: 2006 **Conteo:** 62 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Los datos fueron recolectados durante intensivas indagaciones y entrevistas durante el 2006. Estas indagaciones constituyen los primeros estudios sistemáticos sobre la anidación de la tortuga carey en la República Dominicana en más de 25 años. La anidación ocurre durante todo el año en este sitio.
Comentarios: Se observó que la toma ilegal de huevos en este sitio es alrededor del 50 por ciento. Durante estos estudios se detectó la anidación a bajo nivel de la tortuga carey (1–4 nidos por temporada) en otros 10 sitios de la República Dominicana.
Contacto SWOT: Jesús Tomás

ECUADOR
Registro de datos 28
Fuente de Datos: Zarate, P. 2008. Hawksbill nesting in Ecuador: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: La Playita de Salango, Las Playitas de los Frailes, Las Tunas, Machalilla, y Playa Cerro Viejo.
Comentarios: La anidación de la tortuga carey es esporádica en Ecuador, con una anidación anual limitada en estas playas.
Contacto SWOT: Patricia Zarate

GUINEA EUATORIAL
Registro de Datos 29
Fuente de Datos: Rader, H., and G. Hearn. 2008. Hawksbill nesting on Bioko Island, Equatorial Guinea. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa A, Isla Bioko
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 1.78 km

Playa de Anidación: Playa B, Isla Bioko
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 3km

Playa de Anidación: Playa C, Isla Bioko
Año: 2006 **Conteo:** 2 nidos **Longitud de la Playa:** 3.34km

Playa de Anidación: Playa D, Isla Bioko
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 3.41km

Playa de Anidación: Playa E, Isla Bioko
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa:** 4.11km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas son patrulladas cada noche desde el 9 de octubre del 2005 al 30 de abril del 2006. La temporada de anidación ocurre de octubre a abril con su apogeo en diciembre y enero.
Contacto SWOT: Gail W. Hearn y Heidi Rader

Registro de Datos 30
Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa.* CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program/Convention on Migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Las playas en tierra firme desde Iduma a Etembue y de Nendyi a Cabo San Juan
Comentarios: La anidación la tortuga carey ha sido reportada en estos sitios. Los números referentes a la anidación son desconocidos.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

ERITREA
Registro de Datos 31
Fuente de Datos: Goitom, M., Teclemariam, Y., and T. Mengstu. 2006. *Field Trip Report on Sea Turtle Nesting Assessment on the Islands of Mojeidi and Aucan.* Massawa, Eritrea: Ministry of Fisheries. Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Aucan

En agosto del 2007, SWOT fue seleccionado como recipiente de la Donación Google que concede publicidad gratuita en línea por medio de *GoogleAdwords.* Este premio le ha permitido a SWOT elevar la concientización sobre el *Reporte SWOT—Estado la Tortugas Marinas del Mundo* y aumentar el tráfico en el sitio electrónico web del SWOT.

© FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE MAHTA GOITOM

Nombres: Mahta Goitom, Yohannes Teclemariam y Tekle Mengstu
Proyecto: Biodiversidad Marina e Insular de la Costa de Eritrea
Localidad: Massawa, Eritrea

Nuestro proyecto ha encontrado que 109 sitios en la Costa del Mar Rojo en Eritrea alberga anidación de la tortuga carey. Nuestras metas han sido sumarizar el estado de las poblaciones de tortuga marina en Eritrea y suministrar recomendaciones de conservación para las autoridades costeras y marinas. Nuestro proyecto se disolvió en diciembre del 2007, pero esperamos que nuestro trabajo genere esfuerzos a largo plazo para conservar y estudiar a las tortugas marinas en nuestro país.

Año: 2006 **Conteo:** 735 nidos Longitud de la Playa: 6.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Estos datos provienen de un conteo único de nidos durante el 1 y 2 de junio del 2006. La temporada de anidación tiene lugar a principios de diciembre hasta finales de junio, con su apogeo en febrero y marzo.

Playa de Anidación: Isla Mojeidi
Año: 2006 **Conteo:** 840 nidos, 47 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 5.8 km
Esfuerzo de monitorización: La playa completa fue estudiada cada noche desde el 18 de mayo al 3 de junio del 2006. La temporada de anidación se inicia a principios de diciembre y concluye a finales de junio, con su apogeo en febrero y marzo.
Contactos SWOT: Mahta Goitom, Tecle Mengstu, y Yohannes Teclemariam

FIJI

Registro de Datos 32

Fuente de Datos: Batibasaga, A., and N. Nand, Fiji Fisheries Department. 2008. Hawksbill nesting in Fiji. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playas Kiuva, Tailevu, Viti Levu
Año: 2006 **Conteo:** 130 neonatos
Comentarios: Esta playa no es monitorizada regularmente. Estos datos provienen de un único encuentro en el 20 de febrero del 2006.

Playa de Anidación: Makogai Island, Provincia de Lomaviti
Año: 2006 **Conteo:** 5 nidos
Comentarios: La playa fue patrullada semanalmente de diciembre del 2005 a enero del 2006. El apogeo de la anidación ocurre de noviembre a febrero.

Playas de Anidación: Isla Hatana, Rotuma y las Islas del Mar del Sur e Isla Treasure en el grupo de islas de Mamanuca
Comentarios: Los datos para el 2006 no fueron disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en estas playas en bajos números.
Contacto SWOT: Aisake Batibasaga y Neema Nand

GUAYANA FRANCESA

Registro de Datos 33

Fuente de Datos: Kelle, L. 2008. Hawksbill nesting in French Guiana: Personal communication. In *SWOT Report—The State of* **the World's Sea Turtles, vol. 3 (2008).**
Comentarios: Las tortugas carey anidan en bajos números en la Guayana Francesa con menos de 20 nidos anuales registrados en todo el litoral. La densidad más alta ocurre en las cercanías de Cayenne, con aproximadamente 2–10 nidos por año.
Contacto SWOT: Laurent Kelle

GABÓN

Registro de Datos 34

Fuente de Datos: Verhage, B., Moundjim, E. B., and S. R. Livingstone. 2006. *Four Years of Marine Turtle Monitoring in the Gamba Complex of Protected Areas, Gabon, Central Africa, 2002–2006.* Gabón: WWF.
Playa de Anidación: Pont Dick, Complejo Gamba
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos **Longitud de la Playa: 5**.75 km
Comentarios: Esta playa alberga ocasionalmente un nivel bajo de anidación de tortuga carey. En el 2003–04, se registraron tres nidos, y en el 2004–05, no se registró ningún nido.
Contacto SWOT: Bas Verhage

GRANADA

Registro de Datos 35

Fuentes de Datos: Lloyd, C., Ocean Spirits. 2008. Hawksbill nesting in Grenada: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Caille, Isla Caille
Año: 2006 **Conteo:** 6 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 350 m
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes nocturnos diarios fueron llevados a cabo entre el 22 de julio y el 15 de agosto del 2006. La temporada de anidación tiene lugar entre julio y octubre con su apogeo en junio y julio.
Contacto SWOT: Carl Lloyd

GUADALUPE, DEPARTAMENTO FRANCÉS DE ULTRAMAR

Registro de Datos 36

Fuente de Datos: Delcroix, E. 2006. *Rapport d'Activité Gestion du Réseau Tortues Marines de Guadeloupe 2006.* Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas Anse à Sable, Galets Rouges, Machette, and Malendure, Côte Sous le Vent Bouillante, Isla Basse-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 19 nidos **Longitud de la Playa:** 0.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron patrulladas diariamente durante sondeos nocturnos y conteos de rastros desde el 14 de mayo al 14 de septiembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Playa Cluny, Isla Basse-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km
Esfuerzo de Monitorización: Los reconocimientos nocturnos y conteos de rastros fueron llevados a cabo dos veces por semana desde el 1ro de abril al 15 de julio del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre.

Playas de Anidación: Playas Figuier, Grande Anse, y Pompierre, Isla Terre-de-Haut des Saintes
Año: 2006 **Conteo:** 12 nidos **Longitud de la Playa:** 1.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas fueron estudiadas tres veces por semana en búsqueda de rastros del 1ro de mayo al 1ro de octubre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto.

Playas de Anidación: Playas Trois-Ilets y Folle Anse, Isla Marie Galante
Año: 2006 **Conteo:** 231 nidos **Longitud de la Playa:** 3.7 km
Esfuerzo de Mintorización: Se llevaron a cabo diariamente reconocimientos nocturnos de junio 10–30 y agosto 6–26 del 2006, al igual que patrullajes nocturnos ocasionales durante otros períodos.

Playas de Anidación: Grande Anse Deshaies, Playa La Perle, y Plage Naturiste, Isla Basse-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos en cada una
Longitud de la Playa: 1.4 km, 0.9 km, and 200 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Varios conteos de rastros fueron llevados a cabo del 1ro de abril al 15 de Julio del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre.

Playa de Anidación: Grande Anse Troix-Rivières, Isla Basse-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: Reconocimientos nocturnos regulares fueron llevados a cabo dos veces por semana desde el 1ro de abril hasta el 30 de septiembre del 2006. Los conteos de rastros fueron llevados a cabo en agosto y septiembre solamente. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre.

Playa de Anidación: Isla Petite-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 53 rastros **Longitud de la Playa:** 4.6 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue estudiada para encontrar rastros dos veces por semana desde el 15 de marzo al 15 de noviembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Plage du Four à Chaux, Ilet Fajou
Año: 2006 **Conteo:** 78 rastros **Longitud de la Playa:** 0.8 km
Esfuerzos de Monitorización: La playa completa fue estudiada semanalmente para encontrar rastros desde el 22 de abril al 15 de septiembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto

Playa de Anidación: Pointe des Châteaux, Isla Basse-Terre
Año: 2006 **Conteo:** 30 nidos **Longitud de la Playa:** 10.2 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada diariamente durante reconocimientos nocturnos y conteos de rastros desde el 1ro de mayo al 30 de septiembre del 2006. La temporada de anidación es de mayo a finales de septiembre con su apogeo en julio y agosto.
Contacto SWOT: Eric Delcroix

GUAM

Fuente de Datos: Wusstig, S. 2008. Hawksbill nesting in Guam: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Comentarios: La última vez que se reportó la anidación de tortugas carey en Guam fue en 1995. Los esfuerzos de monitorización en años recientes no han hallado evidencia de la anidación por parte de las tortugas carey.
Contacto SWOT: Shawn Wusstig

GUATEMALA

Registro de Datos 37

Fuente de Datos: Fundación Mario Dary Rivera, Consejo Nacional de Áreas Protegidas and The Nature Conservancy. 2006. P*lan de Conservación de Área 2007–2011 Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.* Guatemala: FUNDARY-PROARCA-TNC.
Playa de Anidación: Punta de Manabique
Comentarios: Los datos de anidación del 2006 no fueron disponibles. Los últimos datos disponibles datan del 2005 cuando 10 nidos fueron localizados y transplantados a un criadero local.

GUINEA

Registro de Datos 38

Fuente de Datos: Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa.* CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program/Convention on Migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Isla Beaches of Roume, Isla Tamara, Isla Blanche, e isla Cabri en las Islas Los.
Comentarios: Datos sobre la anidación para el 2006 no se encuentran disponibles. Un nivel bajo de anidación de tortuga carey ha sido detectado en cada una de estas islas.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

GUINEA-BISSAU

Registro de Datos 39

Fuente de Datos: (1) Barbosa, C., Broderick, A., and P. Catry. 1998. Marine turtles in the Orango National Park (Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau). *Marine Turtle Newsletter* 81: 6–7. (2) Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa.* CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Dispersas playas en el Parque Nacional Orango, Archipiélago de Bijagós.
Comentarios: La anidación de la tortuga carey ha sido detectada en varias islas del Archipiélago de Bijagós, incluyendo, Adonga, Baia las Escaramuças, Cavalos, Meio, Poilão, y Uité. Los números anuales de la anidación son inciertos pero se piensa que son bajos.

GUAYANA

Registro de Datos 40

Fuente de Datos: Kalamandeen, M., DeFreitas, R., Stewart, K., and P. Pritchard, 2006. Aspects of Marine Turtle Nesting in Guyana, 2006. Guianas Forests and Environmental Conservation Project (GFECP). World Wildlife Fund: Technical Report.
Playas de Anidación: Playas Almond, Annette, Luri, y Tiger.
Año: 2006 **Conteo:** 10 hembras anidadoras, 3 rastros falsos
Longitud de la Playa: 140 km en total
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos diarios que cubrieron aproximadamente 25 por ciento de las playas fueron llevados a cabo entre el 4 de marzo al 28 de agosto del 2006. La temporada de anidación tiene lugar desde comienzos de marzo a finales de agosto con su apogeo en mayo y junio.
Contacto SWOT: Michelle Kalamandeen

HONDURAS

Registro de Datos 41

Fuente de Datos: Aronne, M. 2000. *Anidación Semiartificial para la Conservación de Tortuga Marina Carey* (Eretmochelys imbricata) *en el Área Protegida de Cayos Cochinos, del 18 Junio al 30 Octubre 2000.* Fundación Hondureña para los Arrecifes Coralinos (HCRF).
Playa de Anidación: Cayos Cochinos
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles son del año 2000 cuando se registraron 10 nidos durante reconocimientos llevados a cabo desde junio 18 a octubre 30.

INDIA

Registro de Datos 42

Fuente de Datos: Andrews, H., Krishnan, S., and P. Biswas. 2006. *The Status and Distribution of Marine Turtles Around the Andaman and Nicobar Archipelago.* India: Andaman and Nicobar Islands Environmental Team, Center for Herpetology/ Madras Crocodile Bank Trust.
Playa de Anidación: Las playas por todo el archipiélago de las Islas Andamán.
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los sitios más importantes para la anidación de las tortugas carey en las Islas Andamán incluyen las Islas Snark, la Isla de South Reef, y la Isla North Brother. Sitios adicionales de anidación incluyen las islas Trilby, Temple, Smith, Ross, Sound cerca de la isla Andaman Norte; Isla North Passage; Isla North Button; Isla Middle Button; Isla Inglish; Islas Neil y Sir Hugh Rose; e Isla Baratang.

Playa de Anidación: Isla Little Andaman
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en varias playas de la isla.

Playa de Anidación: Parque Marino Nacional Mahatma Ghandi, Isla Andamán Sur
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en las islas Jolly Boy, Grub, Boat, y Tarmugli dentro del parque.

Playas de Anidación: Playas de las Islas Nicobar
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se tienen reportes sobre once islas dentro del grupo de las islas Nicobarque reciben anidación de las tortugas carey.
Contactos SWOT: Harry Andrews y Manish Chandi

INDONESIA

Registro de Datos 43

Fuente de Datos: Putra, K. S. 2005. *Brief Overview of Turtle Conservation in Indonesia (May 2005).* Unpublished report.
Playa de Anidación: Bantul, Yogyakarta
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles provienen del 2002 cuando se registró la anidación de tres tortugas carey. Los números anuales sobre la anidación de las tortugas carey no se encuentran disponibles.

Playa de Anidación: Islas Natuna y Anambas, Islas Riau
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en estas islas.

Playa de Anidación: Playa Ngagelan, Parque Nacional Alas Purwo, Java Oriental
Longitud de la Playa: 19 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles provienen del 2004, cuando se registró la anidación de 10 tortugas carey. Los números anuales sobre la anidación de las tortugas carey no se encontraron disponibles.

Playa de Anidación: Perancak, Bali
Longitud de la Playa: 3 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles son del 2004, cuando se registró la anidación de 3 tortugas carey. Los números anuales sobre la anidación de las tortugas carey no se encontraron disponibles.

Playa de Anidación: Pulau Banyak, Sumatra del Norte
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en estas islas
Contacto SWOT: Ketut Sarjana Putra

Registro de Datos 44

Fuente de Datos: Everlasting Nature of Asia. Project in Indonesia. http://www.elna.or.jp/en/pj_id/index.html.
Playa de Anidación: Isla Momperang, Islas Momperang
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 50 y 150 nidos
Longitud de la Playa: 1 km

Playa de Anidación: Isla Pesemut, Islas Momperang
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 100 y 200 nidos
Longitud de la Playa: 1.5 km

Playa de Anidación: Isla Segama Besar
Año: 2006 **Conteo:** se registró el cálculo de 150 y 250 nidos anuales
Longitud de la Playa: 1.4 km

Playa de Anidación: Isla Segama Kecil
Año: 2006 **Conteo:** se calcula entre 100 y 150 nidos por año
Longitud de la Playa: 1 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentraron disponibles para las cuatros playas mencionadas anteriormente. Se sabe que las tortugas carey anidan en estas islas y estos cálculos se basan en los esfuerzos previos de monitorización con diversos niveles de esfuerzo.
Contacto SWOT: Hiroyuki Suganuma

IRÁN

Registro de Datos 45

Fuente de Datos: Mobaraki, A. 2006. *Report on Sea Turtle Tagging Program in Iran.* Bureau of Wildlife and Aquatic Affairs, Department of the Environment. Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Hendourabi, Provincia de Hormozgan
Año: 2006 **Conteo:** 25 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: Aproximadamente 5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada cada noche desde el 14 de abril hasta el 19 de abril. La temporada de anidación tiene lugar de marzo a mayo, con su apogeo en abril.

Playa de Anidación: Isla Nakhiloo, Provincia de Booshehr
Año: 2006 **Conteo:** 34 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada cada noche desde el 26 de mayo hasta el 31 de mayo del 2006. La temporada de anidación ocurre desde abril a junio con su apogeo en mayo.

Playa de Anidación: Isla Ommolkaram, Provincia de Booshehr
Año: 2006 **Conteo:** 32 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 10 km
Esfuerzo de Monitortización: Se patrullaron dos kilómetros de playa cada noche desde el 1ro de junio al 5 de junio del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de abril a junio con su apogeo en mayo.

Playa de Anidación: Isla Shidvar, Provincia de Hormozgan
Año: 2006 **Conteo:** 21 hembras marcadas, >100 rastros
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitoring: Se patrulló la playa completa cada noche desde el 1ro de abril al 14 de abril del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de marzo a mayo con su apogeo en abril.
Contacto SWOT: Asghar Mobaraki

JAMAICA

Registro de Datos 46

Fuente de Datos: (1) Tennant, M. 2008. Hawksbill nesting on Gibraltar Beach, Jamaica. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008). (2) Harker, T. 2006. *Status and Conservation of Sea Turtles in Jamaica.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Gibraltar, Oracabessa, St. Mary
Año: 2006 **Conteo:** 26 nidos **Longitud de la Playa:** 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Se patrulló la playa completa cada noche y cada mañana desde el 6 de abril hasta finales de diciembre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de abril a noviembre con su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Cayos Portland Bight y el Área de Hellshire
Año: 2006 **Conteo:** 102 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Se patrulló la playa completa dos veces por semana desde el 1ro de mayo a octubre 26 del 2006. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de julio a septiembre.
Contacto SWOT: Shakira Azan y Andrea Donaldson

El Reporte SWOT, Vol II fue seleccionado entre más de 10,000 obras para ser desplegado en primera plana en el ejemplar de diciembre del 2007 de *Graphic Design USA,* una revista anual que resalta las mejores publicaciones en diseño gráfico del año.

JAPÓN

Registro de Datos 47

Fuente de Datos: Sea Turtle Association of Japan. 2006. Sea turtle data in 2006: Nesting of hawksbill turtles in 2006. In *Proceedings of the 17th Japan Sea Turtle Symposium.* November 18–20, 2006, Kumano Shichirimihama, Japan. Japan: Sea Turtle Association of Japan.
Playa de Anidación: Ishigakishima Island
Año: 2006 **Conteo:** 1–10 nidos
Contacto SWOT: Irene Kinan y Yoshi Matsuzawa

JUAN DE NUEVA ISLA, TERRITORIO FRANCÉS DE ULTRAMAR

Registro de Datos: 48

Fuente de Datos: Bourjea, J., and S. Ciccione. 2008. Hawksbill nesting in French Overseas Territories: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Juan de Nova y otras islas aledañas
Año: 2006 **Conteo:** 10 rastros **Longitud de la Playa:** 7 km
Esfuerzo de Monitorización: Estas playas fueron patrulladas diariamente desde el 1ro. de enero hasta diciembre 31 del 2006. La temporada de anidación ocurre de noviembre a enero con su apogeo en diciembre.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

KENIA

Registro de Datos 49

Fuente de Datos: Olendo, M. 2008. Hawksbill nesting in Kenya: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Kongowale
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido confirmado
Comentarios: En mayo del 2006 se registró un evento de anidación de tortuga carey en esta playa. La anidación de la tortuga carey en Kenia es muy esporádica.
Contacto SWOT: Mike Olendo

LIBERIA

Registro de Datos 50

Fuente de Datos: Save My Future Foundation (SAMFU). 2008. Hawksbill nesting in Liberia: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Bafu Bay, Condado de Sinoe
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. En la temporada de anidación del 2006–2007 se registraron siete nidos de tortuga carey entre el 15 de noviembre del 2006 y el 15 de septiembre del 2007.

Playa de Anidación: Borgor Point, Condado de Rivercess
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. En la temporada del 2006–2007 se registraron ocho nidos de tortuga carey desde octubre del 2006 hasta abril del 2007.
Contactos SWOT: Alex Peal

MADAGASCAR

Registro de Datos 51

Fuente de Datos: Bourjea, J., Ciccione, S. and R. Rantsimbazafy. 2006. Marine turtle survey in Nosy Iranja Kely, northwestern Madagascar. *Western Indian Ocean Journal of Marine Science,* 5(2): 209–212.
Playa de Anidacaión: Isla Iranja Kely, Nosy Be
Longitud de la Playa: 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Los últimos datos disponibles provienen del 2003 al 2004 cuando se registraron 28 nidos. Estas playas fueron patrulladas cada noche desde el 1ro de enero del 2000 a diciembre 31 del 2004 cuando se registró un cálculo de 20 nidos por año. La temporada de anidación de la tortuga carey tiene lugar de diciembre a marzo con su apogeo entre diciembre y enero.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

MALASIA

Registro de Datos 52

Fuente de Datos: Wagiman, S., Malaysia Fisheries Department. 2008. Hawksbill nesting in Johor, Malacca, Pahang, and Tereng-

ganu, Malaysia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Cherating, Estado de Pahang
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 3.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue patrullada cada noche desde febrero a octubre del 2006. La temporada de anidación se extiende de abril a octubre.

Playas de Anidación: Playas del Estado de Malaca
Año: 2006 **Conteo:** 388 nidos **Longitud de la Playa:** 20 km
Esfuerzo de Monitorización: Estos datos fueron recolectados durante diarios patrullajes nocturnos llevados a cabo por recolectores autorizados de huevos durante todo el año. En la Isla Upeh, los patrullajes fueron llevados a cabo cada noche por el personal de WWF Malasia entre abril y agosto y por recolectores de huevos autorizados durante los meses de baja anidación. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo en los meses de abril hasta agosto.
Comentarios: Este constituye un conteo general para todas las áreas en Malaca, incluyendo específicamente las playas alrededor Kampung Padang Kemunting, Kem Terendak, Kuala Linggi, y la isla Upeh.

Playas de Anidación: Islas Mersing, Estado de Johor
Año: 2006 **Conteo:** 39 nidos
Esfuerzo de Monitorización: Parte de la playa fue monitorizada cada noche desde marzo hasta finales de septiembre del 2006. La temporada de anidación ocurre entre abril y agosto.

Playas de Anidación: Playa Mak Kepit y Playa Mak Simpan, Pulau Redang, Estado de Terengganu
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos **Longitud de la Playa:** 450 m
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a cabo patrullajes cada noche en ambas playas desde abril a octubre del 2006.
Contacto SWOT: Eng-Heng Chan y Sukarno Wagiman

Registro de Datos 53
Fuente de Datos: Bali, J., Sarawak Forestry Corporation. 2008. Hawksbill nesting in Sarawak, Malasia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Pulau Satang Besar, Sarawak
Año: 2006 **Conteo:** 10 nidos **Longitud de la Playa:** 150 m
Esfuerzo de Monitorización: Diariamente se llevaron a cabo reconocimientos nocturnos de la playa completa durante todo el año. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de diciembre a marzo.
Contacto SWOT: James Bali y Eng-Heng Chan

Registro de Datos 54
Fuente de Datos: Sabah Department of Wildlife. 2008. Hawksbill nesting in Sabah, Malaysia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Lankayan, Sabah
Año: 2006 **Conteo:** 45 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km
Esfuerzo de Monitorización: Durante todo el año se llevaron a cabo reconocimientos de la playa cada noche. La anidación tiene lugar durante todo el año, con su apogeo de junio a julio.
Contacto SWOT: Eng-Heng Chan

Registro de Datos 55
Fuente de Datos: Marine Research Unit, Sabah Parks. 2007. *Turtle Islands Park and Sipadan Island Turtle Research Report.* Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas de Sabah Turtle Islands, Sabah
Año: 2006 **Contacto:** 514 nidos **Longitud de la Playa:** 2.7 km
Esfuerzo de Monitorización: En estas playas se llevaron a cabo reconocimientos cada noche durante todo el año. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo desde febrero a abril y de junio a julio.

Playa de Anidación: Isla Sipadan, Sabah
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 1.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a acabo reconocimientos de la playa entera cada noche desde el 1ro de enero a diciembre 31 del 2006. La temporada de anidación ocurre de enero a junio.
Contacto SWOT: Fazrullah Rizally

ISLAS MALDIVAS

Registro de Datos 56
Fuente de Datos: Zahir, H. 2008. Hawksbill nesting in Maldives: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Dharaboodhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada data de 1999, cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla Dhebaidhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada data del 2003 cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla Feevah
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en el 2000, cuando siete nidos fueron anotados.

Playa de anidación: Isla Kuburudhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1999, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla Maalhoss
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada data de 1998, cuando ocho nidos fueron anotados.

Playa de Anidación: Isla Maavah
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1996, cuando se anotaron siete nidos.

Playa de Anidación: Isla Maroshi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1996, cuando siete nidos fueron anotados.

Playa de Anidación: Isla Medhafushi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1996, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla Minimasgali
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1995, cuando se anotaron seis nidos.

Playa de Anidación: Isla Muthaafushi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en 1998, cuando se anotaron 8 nidos.

Playa de Anidación: Isla Vaikaramuraidhoo
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. La última anidación registrada ocurrió en el 2000, cuando siete nidos fueron registrados.
Contacto SWOT: Hussein Zahir

MARTINICA, DEPARTAMENTO FRANCÉS DE ULTRAMAR

Registro de Datos 57
Fuente de Datos: (1) National Office of Wildlife and Hunting. Unpublished data from the 2006 nesting season. (2) NGOSEPANMAR. *Nesting Season 2006: Parts 1, 2, and 3.* Fort de France, Martinique: Ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Technical report. (3) NGOKAWAN, Marine Turtle Network of Martinique. 2008. Hawksbill nesting in Martinique. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Anse à Prunes (costa suroriental)
Año: 2006 **Conteo:** 2 nidos, 5 actividades de anidación
Longitud de la Playa: 0.54 km

Playa de Anidación: Anse à Voile (costa norte caribeña)
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos confirmados, 4 rastros
Longitud de la Playa: 260 m

Playa de Anidación: Anse Charpintiere (costa atlántica noroeste)
Año: 2006 **Conteo:** 2 nidos, 5 rastros falsos
Longitud de la Playa: 0.845 km

Playa de Anidación: Anse Colas (costa caribeña media)
Año: 2006 **Conteo:** 2 rastros **Longitud de la Playa:** 250 m

Playa de Anidación: Anse Couleuvre (costa norte caribeña)
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido confirmado, nueve rastros
Longitud de la Playa: 340 m

Playa de Anidación: Anse Lévrier (costa norte caribeña)
Año: 2006 **Conteo:** 5 rastros **Longitud de la Playa:**200 m

Playa de Anidación: Anse Meunier (costa suroriental)
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:**1.5 km

Playa de Anidación: Anse Trabaud (costa suroriental)
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:**1.5 km

Playa de Anidación: Dizac Diamant (costa sur)
Año: 2006 **Conteo:** 11 nidos, 14 rastros falsos, 12 rastros
Longitud de la Playa: 2.9 km

Playa de Anidación: Grande Anse Loraine (costa atlántica noroeste)
Año: 2006 **Conteo:** 9 nidos, 1 rastro falso
Longitud de la Playa: 1.65 km

Playa de Anidación: Grande Anse d'Arlet (costa caribeña sur)
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 0.9 km

Playa de Anidación: Grande Anse Salines (costa suroriental)
Año: 2006 **Conteo:** 9 nidos, 44 rastros, 16 actividades de anidación
Longitud de la Playa:1.23 km

Playa de Anidación: Grande Terre (costa suroriental)
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos, 4 actividades de anidación
Longitud de la Playa: 0.59 km

Playa de Anidación: Madiana (costa caribeña media)
Año: 2006 **Conteo:** 4 rastros **Longitud de la Playa:** 200 m

Playa de Anidación: Plage de la Française (costa caribeña media)
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 150 m

Playa de Anidación: Rade de Sainte Marie (costa atlántica noroeste)
Año: 2006 **Conteo:** 2 nidos **Longitud de la Playa:** 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas de Martinica mencionadas anteriormente fueron monitorizadas a varios niveles de intensidad, que variaron de patrullajes diarios o nocturnos diariamente, a patrullajes semi-semanales o a observaciones únicas durante varias porciones de la temporada de anidación. La temporada de anidación en todas las playas ocurre de mayo a septiembre con su apogeo en junio.
Contacto SWOT: Claire Cayol

COLECTIVIDAD FRANCESA DE ULTRAMAR MAYOTE

Registro de Datos 58
Fuente de Datos: Bourjea, J., and S. Ciccione. Hawksbill nesting in French Overseas Territories: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Mayotte
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encuentran disponibles. Se calcula que anualmente se reciben 30 nidos en la Isla Mayote.
Contacto SWOT: Jérome Bourjea y Stephane Ciccione

MÉXICO

Registro de Datos 59
Fuente de Datos: Cuevas, E., Canul-Rosado, D., Tzeek-Tuz, M., Muñoz-Terán, K., and F. Loyo-Buenfil. 2006. *Reporte Final de Actividades de Conservación en las Playas de Anidación de Celestún y El Cuyo en Yucatán e Isla Holbox en Quintana Roo, México.* Mérida, Yucatán, Mexico: Pronatura Península de Yucatán. Unpublished report.

© FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE EDITH Y RICHARD VAN DEL WAL

Nombres: Edith y Richard van der Wal
Proyecto: Tortugaruba Foundation
Localidad: Aruba

La Fundación Tortugaruba protege los nidos de las Tortugas laúd, caguama, verde y carey contra las amenazas del desarrollo costero en Aruba: el alumbrado artificial, tráfico vehicular en la playa, contaminación y pérdida del hábitat. La línea telefónica de emergencia de Tortugaruba, que opera las 24 horas al día, 7 días a la semana, ha aumentado considerablemente la concientización sobre la conservación de las tortugas marinas entre los residentes y los turistas de Aruba.

Playa de Anidación: Celestún, Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán
Año: 2006 **Conteo:** 348 nidos **Longitud de la Playa:** 24 km

Playa de Anidación: El Cuyo, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán
Año: 2006 **Conteo:** 286 nidos **Longitud de la Playa:** 31 km

Playa de Anidación: Isla Holbox, Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo
Año: 2006 **Conteo:** 602 nidos **Longitud de la Playa:** 24 km
Esfuerzo de Monitorización: Cada noche se llevaron a cabo patrullajes de playa completa desde el 1ro. de abril al 31 de agosto del 2006, en todas las playas mencionadas anteriormente. La temporada de anidación es de abril a agosto con su apogeo en junio.
Contacto SWOT: Eduardo Cuevas

Registro de Datos 60
Fuente de Datos: CONANP, and Comité Estatal para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas del Estado de Campeche. 2008. Hawksbill nesting in Campeche, Mexico. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Chachito, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 35 nidos **Longitud de la Playa:** 8.1 km

Playa de Anidación: Ensenada, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 55 nidos **Longitud de la Playa:** 6 km

Playa de Anidación: Isla Arena, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 35 nidos **Longitud de la Playa:** 8 km

Playa de Anidación: San Lorenzo, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 23 nidos **Longitud de la Playa:** 1.8 km

Playa de Anidación: Victoria, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 40 nidos **Longitud de la Playa:** 22.73 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron llevados a cabo desde el 1ro de abril a septiembre 30 del 2006 en cada una de las playas mencionadas anteriormente. La temporada de anidación es de abril a septiembre con su apogeo en junio.

Playa de Anidación: Chenkan, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 279 nidos **Longitud de la Playa:** 20 km

Playa de Anidación: Isla Aguada, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 236 nidos **Longitud de la Playa:** 27.75 km

Playa de Anidación: Isla del Carmen, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 245 nests **Longitud de la Playa:** 35 km

Playa de Anidación: Punta Xen, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 520 nidos **Longitud de la Playa:** 30 km

Playa de Anidación: Sabancuy, Campeche
Año: 2006 **Conteo:** 227 nidos **Longitud de la Playa:** 24.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron llevados a cabo desde el 1ro de abril a octubre 30 del 2006 en cada una de las cinco playas mencionadas anteriormente. La temporada de anidación es de abril a octubre con su apogeo en junio.
Contacto SWOT: Vicente Guzman H.

MOZAMBIQUE
Registro de Datos 61
Fuente de Datos: Costa, A. 2007. *Report of Marine Turtle Conservation in Quirimbas National Park, Cabo Delgado.* Maputo, Mozambique: Marine Programme, WWF Mozambique.
Playas de Anidación: Playa Paquissico Tchawane y Playa Lemani, Parque Nacional Quirimbas, Cabo Delgado
Longitud de la Playa: 5 km
Comentarios: Los datos sobre la anidación en la temporada del 2005–06 no se encuentran disponibles. En 2006–07, se observaron 104 neonatos de tortuga carey durante los patrullajes matutinos y nocturnos cotidianos desde el 1ro de octubre del 2006 al 6 de junio del 2007.
Contacto SWOT: Alice Costa

Registro de Datos 62
Fuente de Datos: Garnier, J., and I. Silva. 2008. Hawksbill nesting in Mozambique. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Rongui e Isla Vamizi
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 12 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron llevados a cabo en ambas islas durante todo el año, incluyendo patrullajes adicionales cada noche durante la temporada de anidación desde noviembre a marzo.
Contactos SWOT: Julie Garnier e Isabel Silva

ANTILLAS HOLANDESAS, BONAIRE
Registro de Datos 63
Fuente de Datos: Nava, M. 2006. *Sea Turtle Conservation Bonaire: Progress Report 2006.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa sin Nombre, Bonaire
Año: 2006 **Conteo:** 42 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playa Pali Mangel
Año: 2006 **Conteo:** 7 nidos **Longitud de la Playa:** 0.7 km
Esfuerzo de Monitorización: En cada una de las playas mencionadas anteriormente la playa completa fue patrullada cada mañana de por medio desde el 15 de mayo hasta finales de diciembre del 2006. El apogeo de la anidación tiene lugar en agosto y septiembre.

Playa de Anidación: Playa Washikemba
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 400 m
Esfuerzo deMonitorización: Playa completa fue patrullada cada mañana de por medio desde el 15 de mayo a fin de diciembre del 2006. El apogeo de la anidación ocurre en octubre.
Contacto SWOT: Mabel Nava

SAN EUSTACIO
Registro de Datos 64
Fuente de Datos: Harrison, E., and A. Herrera. 2006. *St. Eustatius Sea Turtle Conservation Programme Annual Report 2006.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Playa Zeelandia, Bahía Kay y Bahía Oranje, San Eustacio
Año: 2006 **Conteo:** 6 nidos, 2 rastros falsos, 1 hembra anidadora **Longitud de la Playa:** 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diurnos y nocturnos de la playa completa fueron llevados a cabo diariamente desde el 17 de mayo al 6 de octubere del 2006. El apogeo de la anidación ocurre en julio.
Contacto SWOT: Arturo Herrera

SAN MARTIN
Registro de Datos 65
Fuente de Datos: Nisbeth, B. M., Nature Foundation. 2008. Hawksbill nesting in Gibbs Bay, St. Maarten. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Gibbs Bay
Año: 2006 **Conteo:** 1 rastro **Longitud de la Playa:** 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa fue patrullada dos veces por semana desde el 1ro. de abril al 1ro. de noviembre del 2006. La temporada de anidación es de abril a noviembre con su apogeo de julio a octubre.
Contacto SWOT: Beverly Mae Nisbeth

Registro de Datos 66
Fuente de Datos: Vissenberg, D., Nature Foundation. 2008. Hawksbill nesting in Guana Bay, St. Maarten. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Bahía Guana
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km
Esfuerzo de Monitorización: Esta playa fue patrullada tres o cuatro noches a la semana desde abril hasta octubre del 2006. La temporada de anidación es de abril a finales de octubre, con su apogeo de mayo a octubre.
Contacto SWOT: Dominique Vissenberg

NICARAGUA
Registro de Datos 67
Fuente de Datos: Urtreaga, J. 2008. Hawksbill nesting in Nicaragua: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: La Flor
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 10–20 nidos
Comentarios: La anidación de la tortuga carey es esporádica a lo largo de la costa del Pacífico en Nicaragua, con un registro de 10 a 20 nidos anualmente en los alrededores de la Flor.
Contacto SWOT: José Urteaga

Registro de Datos 68
Fuente de Datos: Campbell, C. L., Lagueux, C. J., and V. Huertas. 2007. *2006 Pearl Cays Hawksbill Conservation Project, Nicaragua.* Wildlife Conservation Society Final Report.
Playa de Anidación: Cayos Perla
Año: 2006 **Conteo:** 200 nidos (mínimo)
Longitud de la Playa: 3.3 km
Esfuerzo de Monitorización: Se llevaron a cabo patrullajes diarios de junio a octubre del 2006. Durante el resto de la temporada de anidación, las playas fueron patrulladas semanalmente o cada semana de por medio. La temporada de anidación tiene lugar de mayo a noviembre con su apogeo de julio a septiembre.
Contacto SWOT: Cathi Campbell y Cynthia Lagueux

OMÁN
Registro de Datos 69
Fuente de Datos: Rees, A. 2008. Hawksbill nesting in Oman. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playas Ros Shiban 1–3
Año: 2006 **Conteo:** 14 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playas Ros Shiban 3–5
Año: 2006 **Conteo:** 27 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playas Ros Shiban 5–7
Año: 2006 **Conteo:** 50 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playas Ros Shiban 7–9
Año: 2006 **Conteo:** 70 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playas del Suroriente
Año: 2006 **Conteo:** 188 nidos **Longitud de la Playa:** 2 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente N
Año: 2006 **Conteo:** 11 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente Omedu
Año: 2006 **Conteo:** 66 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km

Playa de Anidación: Playas del Suroccidente S
Año: 2006 **Conteo:** 36 nidos **Longitud de la Playa:** 1 km
Contacto SWOT: ALan Rees

PALAU
Registro de Datos 70
Fuente de Datos: Klain, S., and J. Eberdong. 2007. *Palau Marine Turtle Conservation and Monitoring Program, 2005–2006: Report to National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).* Unpublished report.
Playas de Anidación: Ngerbelas, Ngeruangel, y Orak, Estado de Kayangel
Año: 2006 **Conteo:** 2, 3, y 5 nests, respectivamente
Longitud de la Playa: 410, 200, y 100 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de estas playas fue monitorizada una vez al mes durante la temporada de anidación.

Playas de Anidación: Isla Breu Rock, Kmekumer, Moir, Playa Neco/Ngeanges, Ngeremdiu, Ngerukeuid, Ngerureomel, Omekang, Ongtekatl, Ouiars, Such, y Ulong, Estado de Koror
Año: 2006 **Conteo:** 3, 13, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, y 7 nidos respectivamente
Longitud de la Playa: 70, 60, 150, 400, 650, 750, 300, 150, 175, 125, 25, y 200 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de estas playas

© FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE SARAH KLAIN

Nombre: Joshua Eberdong y Sarah Klain
Proyecto: Programa de Conservación y Monitorización de Tortugas Marinas (MTCMP)
Localidad: Palau

El MTCMP incluido dentro el Despacho de Recursos Marinos de Palau, es un esfuerzo colaborativo entre el Estado de Palau y los gobiernos nacionales. Los oficiales de conservación estatal trabajan en las playas de anidación de las islas principales de Palau y en las remotas Islas de Merir y Helen. Nuestro trabajo incluye la monitorización de la anidación, la investigación sobre el marcaje y el programa de observación de pesquerías. La documentación de las migraciones internacionales ha sido uno de los resultados más exitosos de este proyecto.

fue monitorizada una vez al mes durante la temporada de anidación.

Playas de Anidación: Playa East /Lisel a Lekeok, Euidelchol, Loulomekang, Kisaks, y Kltaliis, Estado de Koror
Año: 2006 **Conteo:** 1, 1, 1, 4, y 2 nidos respectivamente
Longitud de la Playa: 0.1, 1.5, 0.7, 0.3, y 0.02 km, respectivamente
Esfuerzo de monitorización: Cada uno de estos registros fue realizado durante una sola observación.

Playas de Anidación: Playa East, Estado de Melekeok
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 3.5 km

Playas de Anidación: Chol, Ngesar/Kwabs, y Ngkeklau, Estado de Ngaraard
Año: 2006 **Conteo:** 5, 1, y 2 nidos, espectivamente
Longitud de la Playa: 2.75, 0.4, y 0.3 km, respectivamente

Playas de Anidación: Ngerchur y Ngerkeklau, Estado de Ngarchelong
Año: 2006 **Conteo:** 5 y 2 nidos, respectivamente
Longitud de la Playa: 0.9 y 0.6 km, respectivamente

Playas de Anidación: Playa Honeymoon Beach y Mesubedumail, Estado de Peleliu
Año: 2006 **Conteo:** 4 y 2 nidos respectivamente
Longitud de la Playa: 1 km cada una
Esfuerzo de Monitorización: Cada una de las playas mencionadas anteriormente en los Estados de Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, y Peleliu fue monitorizada una vez al mes durante la temporada de anidación, con la excepción de Ngerchur, Estado de Ngarchelong, la cual fue visitada solamente una vez.
Comentarios: La temporada de anidación en todas las playas en Palau es de Mayo a Agosto.
Contacto SWOT: Joshua Eberdong y Sarah Klain

PANAMÁ

Registro de Datos 71

Fuente de Datos: Patiño-Martínez, J., and L. Quiñones. 2008. Hawksbill nesting in Panama: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidfación: Anatxukuna y Armila, Kuna Yala
Longitud de la Playa: 0.88 and 4.5 km, respectively
Comentarios: Cada una de estas playas contiene anidaciones sin cuantificar de la tortuga carey que se inician en mayo y terminan en una fecha no especificada. Esta información fue recolectada por el personal de observación durante conteos de rastros y entrevistas con la población local.
Contacto SWOT: Juan Patiño-Martínez

Registro de Datos 72

Fuente de Datos: Ordoñez, C., et al. 2007. *Report on Monitoring and Research Activities, Chiriqui Beach, Panama.* Unpublished report.
Playas de Anidación: Chiriqui Beach, Bocas del Toro province
Año: 2006 **Conteo:** 537 nidos **Longitud de la Playa:** 24 km
Esfuerzo de Monitorización: La playa completa fue estudiada semanalmente en búsqueda de rastros en los meses de enero y diciembre del 2006 y tres a cuatro veces por semana en febrero y noviembre. Se patrullaron quince kilómetros de playa cada noche desde el 1ro de marzo al 31 de octubre del 2006. La temporada de anidación tiene lugar de marzo a noviembre con su apogeo de junio a agosto.
Contacto SWOT: Emma Harrison y Cristina Ordoñez

Registro de Datos 73

Fuente de Datos: Meylan, P., and A. Meylan. 2007. Ecología y Migración de las Tortugas Marinas en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá. Unpublished report to Autoridad Nacional del Ambiente.
Playa de Anidación: Playa Larga, Provincia de Bocas del Toro
Año: 2006 **Conteo:** 34 nidos **Longitud de la Playa:** 3 km
Comentarios: Los patrullajes diarios de la playa completa fueron llevados a cabo desde el 25 de marzo al 21 de octubre del 2006. La temporada de anidación es de abril a octubre con su apogeo en julio y agosto.

Playa de Anidación: Cayos Zapatilla, Provincia de Bocas del Toro
Año: 2006 **Conteo:** 172 nidos **Longitud de la Playa:** 4.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Patrullajes diarios de la playa completa fueron llevados a cabo desde le 1ro. de mayo al 30 de noviembre del 2006. La temporada de anidación es de abril a octubre con su apogeo en julio y agosto.
Contacto SWOT: Anne Meylan

PAPÚA NUEVA GUINEA

Registro de Datos 74

Fuente de Datos: Krueger, B. 2008. Hawksbill nesting in Papua New Guinea: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playas de Anidación: Isla Kudube, Isla Takala, e Isla Utube
Longitud de la Playa: 525 m en total
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. En la temporada de anidación del 2007, se registraron 116 nidos de tortuga carey. La temporada de anidación es de octubre a marzo.
Contacto SWOT: Barry Krueger

FILIPINAS

Registro de Datos 75

Fuente de Datos: (1) Torres, D., Santa Cruz, E., Mansanero, L. I., and G. A. Santa Cruz. 2004. *Conservation of a Remnant Hawksbill Nesting Habitat in Punta Dumalag, Brangay Matina Aplaya, Davao City, Philippines.* (2) Cruz, R. 2008. Hawksbill nesting in the Philippines: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Apo Reef, Sablayan, Provincia Occidental Mindoro
Año: 2006 **Conteo:** 4 hembras anidadoras
Comentarios: Se llevaron a cabo patrullajes cada noche alrededor de esta isla de 22 hectáreas en la medida que el clima lo permitió. Los hallazgos iniciales indican que la temporada de anidación ocurre de mayo a septiembre

Playas de Anidación: Bagac y Morong, Provincia de Bataan
Longitud de la Playa: Aproximadamente 7 km
Comentarios: Con base en la diaria monitorización nocturna durante la temporada de anidación de la tortuga golfina (de agosto a marzo), se tiene el cálculo de uno a dos nidos por año en estas playas.

Playas de Anidación: Botolan, Iba, y San Antonio, Provincia Zambales
Longitud de la Playa: 48.6 km
Comentarios: Con base en la monitorización actual se estima que existen de una a tres hembras anidadoras por año en estas playas.

Playas de Anidación: Matina, Punta Damalag, Davao City, e Isla Samal, Golfo de Davao
Año: 2006 **Conteo:** >3 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 1.04 km

Playas de Anidación: Isla Panikian, Pitogo, Provincia Zamboanga del Sur
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Los últimos datos disponibles datan del año 2000, cuando se registraron tres hembras anidadoras.
Contacto SWOT: Renato Cruz y Romeo Trono

PUERTO RICO

Registro de Datos 76

Fuente de Datos: L. Montero, 2006. *Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas Humacao, Yabucoa y Maunabo, Puerto Rico, Temporada 2006.* DNER-PR, Unpublished report.
Playa de Anidación: Caja-de-Muertos
Año: 2006 **Conteo:** 64 nidos **Longitud de la Playa:** 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos fueron llevados a cabo en una mitad de la playa desde el 1ro. de enero hasta el 30 de diciembre del 2006. La temporada de anidación es de enero a diciembre con su apogeo en septiembre y octubre.

Playa de Anidación: Culebra
Año: 2006 **Conteo:** 51 nidos **Longitud de la Playa:** 6 km

Playa de Anidación: Humacao
Año: 2006 **Conteo:** 94 nidos **Longitud de la Playa:** 9 km

Playa de Anidación: Playas de El Faro, Mario, Los Bohíos, y California, Maunabo
Año: 2006 **Conteo:** 31 nidos **Longitud de la Playa:** 5.15 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos de la playa completa fueron llevados a cabo en cada una de las áreas mencionadas anteriormente desde el 12 de Julio al 15 de diciembre del 2006. La temporada de anidación es de julio a diciembre con su apogeo en septiembre y octubre.
Contactos SWOT: Carlos Diez y Robert van Dam

Registro de Datos 77

Fuente de Datos: Diez, C. E., and R. P. van Dam. 2007. *Mona and Monito Island, Puerto Rico, Hawksbill Turtle Research Project, Research Report for 2006.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Mona
Año: 2006 **Conteo:** 951 nidos **Longitud de la Playa:** 7.1 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios matutinos de la playa completa fueron llevados a cabo desde el 8 de agosto al 5 de diciembre del 2006. El apogeo de la anidación ocurre en septiembre y octubre.
Contactos SWOT: Carlos Diez y Robert van Dam

QATAR

Registro de Datos 78

Fuente de Datos: Pilcher, N. J., Marine Research Foundation. 2005. *Final Report: Status of Sea Turtles in Qatar.* Qatar: Supreme Council for the Environment and Natural Reserves.
Playa de Anidación: Playa Fuwairit
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Durante un reconocimiento del 15 de abril al 31 de julio del 2005, se registraron 27 hembras anidadoras y 67 eventos de anidación.
Contacto SWOT: Nicolas Pilcher

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Registro de Datos 79

Fuente de Datos: St. Kitts Sea Turtle Monitoring Network, Ross University School of Veterinary Medicine. 2008. Hawksbill nesting in St. Kitts. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Cayon a Keys, San Cristóbal
Año: 2006 **Conteo:** se calcula 1 nido
Longitud de la Playa: 4 km

Playa de Anidación: Conaree, San Cristóbal
Año: 2006 **Conteo:** se calculan 6 nidos
Longitud de la Playa: 3 km

Playa de Anidación: Bahía Majors, San Cristóbal
Año: 2006 **Conteo:** se calculan 22 nidos
Longitud de la Playa: 0.6 km
Esfuerzo de Monitorización: Las tres playas mencionadas anteriormente fueron estudiadas durante patrullajes matutinas semanales desde el 1ro de Julio al 30 de septiembre del 2006. La temporada de anidación es de julio a febrero.
Contacto SWOT: Kimberly Stewart

Registro de Datos 80

Fuente de Datos: Pemberton, E., Nevis Department of Fisheries. 2008. Hawksbill nesting in Nevis. In S*WOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Lover's Beach, Nubes
Año: 2006 **Conteo:** 86 nidos **Longitud de la Playa:** 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes nocturnos fueron llevados a cabo de tres a cinco noches por semana al igual que los patrullajes matutinos posteriores a las noches sin monitorización desde el 1ro de abril al 10 de diciembre del 2006. La temporada de anidación ocurre desde marzo a principios de diciembre, con su apogeo de julio a septiembre.
Contacto SWOT: Emile Pemberton

SANTA LUCIA

Registro de Datos 81

Fuente de Datos: Durrell Wildlife Conservation Trust and St. Lucia Forestry Department (Ministry of Agriculture). 2008. Hawksbill nesting in St. Lucia. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Playa Grande Anse
Año: 2006 **Conteo:** 2 rastros **Longitud de la Playa:** 1.26 km

Playa de Anidación: Playa Louvet
Año: 2006 **Conteo:** 4 nidos **Longitud de la Playa:** 406 m
Esfuerzo de Monitorización: Los estudios semanales fueron llevados a cabo desde el 23 de febrero hasta el 10 de agosto del 2006 en cada una de las playas mencionadas anteriormente. La temporada de anidación tiene lugar de marzo a noviembre con su apogeo de abril a junio.
Contacto SWOT: Matthew Morton

SAMOA

Registro de Datos 82

Fuente de Datos: Momoemausu, M., Ward, J., Iakopo, M., Ifopo, P., and F. Sio. 2006. *Report on the Hawksbill Turtle Nesting Survey 2005–2006.* Samoa: Division of Environment and Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment. Unpublished report.
Playas de Anidación: Playas Nuutele y Vini en la Isla Nuutele, y las playas Namua y Nuulua en la Isla Upolu
Año: 2006 **Conteo:** 27 nidos
Longitud de la Playa: 430, 680, 160, y 420 m, respectivamente
Esfuerzo de Monitorización: Estas playas fueron patrulladas cada noche durante una semana durante el apogeo de la temporada de anidación en enero y febrero. Durante los meses

fuera del apogeo de la anidación (de octubre a junio), las playas fueron visitadas cada dos semanas.
Contactos SWOT: Malama Momoemausu y Juney Ward

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Registro de Datos 83

Fuente de Datos: MARAPAONG and PROTOMAC. Rapport des Activités. São Tomé and Príncipe, Central Africa. Unpublished report.
Playas de Anidación: Beaches of Príncipe
Año: 2006 **Conteo:** 36 nidos

Playas de Anidación: Beaches of São Tomé
Año: 2006 **Conteo:** 38 nests
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios de todas las playas fueron llevados a cabo desde el 3 de octubre al 30 de abril del 2006. La temporada de anidación es de septiembre a abril.
Contacto SWOT: Alain Gibudi y Elisio Neto

ARABIA SAUDITA

Registro de Datos 84

Fuente de Datos: Pilcher, N. J. 1999. The hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata,* in the Arabian Gulf. *Chelonian Conservation and Biology,* vol. 3, no. 2 (1999).

Playa de Anidación: Isla Jana
Longitud de la Playa: 1.6 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1992, cuando se marcaron 120 hembras anidadoras en la Isla Jana durante un estudio del 3 de junio al 24 de junio.

Playa de Anidación: Isla Jurayd
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1991, cuando 10 hembras anidadoras fueron marcadas entre el 27 de mayo y el 18 de junio.

Playa de Anidación: Isla Karan
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Los datos disponibles más recientes datan de 1992 cuando siete hembras anidadoras fueron marcadas durante reconocimientos entre el 5 de julio y el 30 de julio. Este estudio fue llevado a cabo durante el apogeo de la temporada de anidación de la tortuga verde y no durante el apogeo del período de anidación para la tortuga carey.

Playa de Anidación: Isla Kurayn
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Los datos disponibles más recientes sobre la anidación datan de 1991 cuando se registraron lo que se calcula ser 34 intentos de anidación en la Isla Kurayn.
Contacto SWOT: Nicolas Pilcher

SENEGAL

Registro de Datos 85

Data Source: Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa.* CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program/Convention on Migratory Species Secretariat.
Playas de Anidación: Playas cerca a Guéréo y en el Delta Saloum
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Se ha reportado que las tortugas carey anidan en pequeños números en estas áreas de Senegal.
Contacto SWOT: Jacques Fretey

SEYCHELLES

Registro de Datos 86

Fuente de datos: Seychelles Islands Foundation (SIF). 2008. Hawksbill nesting in Aldabra Atoll, Seychelles. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Atolón de Aldabra
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 20–50 nidos
Comentarios: En el Atolón de Aldabra ocurre una anidación escasa, con la mayoría de los nidos depositados en el área de la laguna de Aldabra. Los cálculos sobre la anidación se basan en los conteos de rastros llevados a cabo por los guardaparques de la Fundación para las Islas Seychelles (SIF, sus siglas en inglés) desde 1981.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 87

Fuente de Datos: Nature Protection Trust of Seychelles. 2007. *2006–2007 Silhouette Conservation Project: Quarterly Report.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Anse Lascars, Isla Silhouette
Longitud de la Playa: 440 m
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. En 2006–2007, se encontraron dos nidos durante patrullajes no regulares. La temporada de anidación es de septiembre a abril, con su apogeo de diciembre a enero.

Playa de Anidación: Anse Patates, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:180 m
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan en este sitio.

Playa de Anidación: Baie Cipailles, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:0.51 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. En el 2006–2007, se encontraron cinco nidos durante patrullajes irregulares. La temporada de anidación es de septiembre a abril, con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: Grande Barbe, Isla Silhouette
Longitud de la Playa:1.45 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. En el 2006–2007, se observaron 250 nidos y se calcula que en general había 360 nidos. La temporada de anidación es de septiembre a abril, con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: La Passe, Isla Silhouette
Longitud de la Playa: 1.77 km
Comentarios: Los datos de anidación para el 2006 no fueron disponibles. En el 2006–2007, se encontraron 5 nidos durante patrullajes irregulares. La temporada de anidación es de septiembre a abril con su apogeo en diciembre y enero.

Playa de Anidación: Pointe Etienne, Isla Silhouette
Año: 2006 **Conteo:** 13 nidos **Longitud de la Playa:** 370 m
Esfuerzo de Monitorización: Los datos provienen de una única observación en diciembre 8 del 2006.
Contacto SWOT: Justin Gerlach

Registro de Datos 88

Fuente de Datos: (1) Island Conservation Society of Seychelles. 2008. Hawksbill nesting in Aride Island Nature Reserve, Seychelles. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008). (2) Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle Component. Final report,* vol. 1 and vol. 2.
Playa de Anidación: Reserva Natural Isla Aride
Año: 2006 **Conteo:** se calcula entre 50 y 60
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación están basados en los conteos diarios de rastros llevados a cabo por el personal de la Island Conservation Society of Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 89

Fuente de Datos: Mortimer, J., and Bird Island Lodge. 2008. Hawksbill nesting on Bird Island, Seychelles: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Bird
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 125 y 200 nidos
Comentarios: El cálculo sobre la anidación se basa en los conteos de rastros y los datos de marcación recolectados por el personal del the Bird Island Lodge.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 90

Fuente de Datos: Nature Seychelles. 2008. Hawksbill nesting on Cousin Island, Seychelles. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Reserva Especial Isla Cousin
Año: 2006 **Conteo:** 331 nidos, 91 hembras marcadas, 419 eventos de anidación
Longitud de la Playa: 1.73 km
Esfuerzo de Monitorización: Esta playa fue patrullada por lo menos una vez al día desde agosto del 2005 a marzo 15 del 2006. La temporada de anidación es de septiembre a mediados de marzo, con su apogeo de noviembre a enero.
Contacto SWOT: Naomi Doak

Registro de Datos 91

Fuente de Datos: Jolliffe, K., and S.-M. Jolliffe. 2008. Hawksbill nesting on Cousine Island, Seychelles: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Cousine, Islas Granitic
Año: 2006 **Conteo:** 66 nidos, 47 rastros falsos, 36 hembras anidadoras
Longitud de la Playa: 0.9 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diurnos a cada hora fueron llevados a cabo del 20 de agosto del 2005 a marzo 5 del 2006. La temporada de anidación es de septiembre a marzo con su apogeo de noviembre a enero.
Contactos SWOT: Kevin y San-Marie Jolliffe

Registro de Datos 92

Fuente de Datos: (1) Marine Parks Authority of Seychelles. 2008. Hawksbill nesting in Curieuse Island Marine Park, Seychelles. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008). (2) Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle Component. Final report,* vol. 1 and vol. 2. (3) Rulie, A. C. 2002. Reflexion sur la conservation de la tortue imbriquee (Eretmochelys imbricata): Application aux Seychelles. *Ecole Nationale Veterinaire Toulouse. Annee 2002 These: 2002-TOU3-4166.*
Playas de Anidación: Ocho playas en el Parque Marino de la Isla Curieuse
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 200 y 250 nidos
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en los conteos de rastros llevados a cabo por Anne-Claire Rulie y los Guarda Parques de la Autoridad del Parque Marino de las Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 93

Fuente de Datos: Mortimer, J. A. 2005. Sea Turtles of D'Arros Island and St. Joseph Atoll: Status and Recommendations. In U. Engelhardt, ed. 2005. *Proceedings of a Scientific Symposium held at the D'Arros Research Centre 15–17 April 2005.* Seychelles: D'Arros Research Centre. Technical Report No. 1.
Playas de Anidación: Isla D'Arros y Atolón de San José
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 250 y 300 hembras anidadoras
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en los conteos de rastros llevados a cabo por el personal de D'Arros Development (Pty) Ltd. y el Centro de Investigaciones D'Arros. Se calcula que aquí se depositan más de 1,000 nidos al año.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 94

Fuente de Datos: Bovenberg, M., and R. Vonk. 2007. *The Hawksbill Turtle* (Eretmochelys imbricata) *on Fregate Island: The Hawksbill Turtle's Nesting Population and Nesting Habitat on Fregate During the North-West Monsoon in 2006–07.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Fragata
Comentarios: Los datos sobre la temporada de anidación del 2005–06 no fueron disponibles. En la temporada de anidación del 2006–07, se calcula que se depositaron 150 nidos en la Isla Fragata, lo cual representa aproximadamente 50 hembras distintas.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 95

Fuente de Datos: Vanherck, L. 2008. Hawksbill nesting on North Island, Seychelles: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Isla Norte
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 30 y 50 nidos
Comentarios: Se calcula que cada año se depositaron entre 30 y 50 nidos durante las temporadas del 2005–06 y el 2006–07 en la Isla Norte. La temporada de anidación es de septiembre a enero.
Contacto SWOT: Linda Vanherck

Registro de Datos 96

Fuente de Datos: Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle Component.* Final report, vol. 1 and vol. 2.
Playas de Anidación: cinco playas en el Parque Marino de Santa Ana.
Año: 2006 **Conteo:** se calculan entre 200 y 250 nidos
Comentarios: Los cálculos sobre la anidación se basan en los conteos de rastros llevados a cabo por los Guarda Parques de la Autoridad del Parque Marino de las Seychelles.
Contacto SWOT: Jeanne A. Mortimer

Registro de Datos 97

Fuente de Datos: Talma, E. 2006. Interim report on 2005–06 Turtle Nesting Season in the South of Mahe, Seychelles. Marine Conservation Society Seychelles. Technical report.
Playas de Anidación: Playas la Isla Mahe Sur
Año: 2006 **Conteo:** 242 nidos **Longitud de la Playa:** 1.83 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diarios fueron llevados a cabo tres veces por semana entre septiembre del 2005 y marzo del 2006, y una vez cada una o dos semanas durante el resto del año. La temporada de anidación es de octubre a febrero con su apogeo en noviembre y diciembre.
Comentarios: Los datos de cinco playas adyacentes han sido combinados.
Contacto SWOT: Elke Talma

Fuente de Datos: Mortimer, J. A. 2008. Hawksbill nesting in the Seychelles: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Comentarios: Las Islas Seychelles compremden más de 120 islas y muchos cientos de playas. La mayoría de las playas en el país albergan algo de anidación por parte de la tortuga carey cada año. Los reportes anteriores presentan datos que fueron recolectados en algunos de los sitios mejor protegidos y mejor estudiados del país, pero de ninguna manera significan que sean exhaustivos.

ISLAS SOLOMÓN

Registro de Datos 98

Fuente de Datos: Siota, C., and P. Ramohia. 2007. *Peak Hawksbill Nesting Activities in the Arnavon Community Marine Conservation Area: A Report for The Nature Conservancy, Solomon Islands Field Office, Honiara.* Unpublished manuscript.
Playa de Anidación: Arnavon Community Managed Conservation Area, Santa Isabel
Año: 2006 **Conteo:** 286 nidos
Longitud de la Playa: Aproximadamente 4.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Estas playas fueron patrulladas cada día y noche desde el 1ro de junio al 31 de agosto del 2006.
Contacto SWOT: Peter Ramohia y Catherine Siota

Registro de Datos 99

Fuente de Datos: Ramohia, P., Siota, C., Motui, D., Routanis, F., Pema, M., Rini, C., Zama, M., Tetabea, T., Madada, L., and G. Willy. 2007. *Hawksbill and Green Turtle Nesting Activities on Kerehikapa Island in the Arnavon Community Managed Conservation Area: A Report for The Nature Conservancy, Solomon Islands Field Office.* Unpublished manuscript.
Playa de Anidación: Isla Kerehikapa, Santa Isabel
Año: 2006 **Conteo:** 345 nidos
Longitud de la Playa: 1.2 km
Esfuerzo de Monitorización: Estas playas fueron patrulladas cada día y noche desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2006.
Contactos SWOT: Peter Ramohia y Catherine Siota

SRI LANKA

Registro de Datos 100

Fuente de Datos: (1) Ekanayake, E. M. L., Ranawana, K. B., Kapurusinghe, T., Premakumara, M. G. C., and M. M. Saman. 2002. Marine turtle conservation in Rekawa turtle rookery in southern Sri Lanka. *Ceylon Journal of Science (Biological Science)* 30: 79–88. (2) The Turtle Conservation Project. Turtle Nesting Beaches in Sri Lanka. http://www.tcpsrilanka.org/download/Map.pdf
Playas de Anidación: Costa sur de Sri Lanka
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encontraron disponibles. Se sabe que las tortugas carey anidan a lo largo de las playas de la costa sur de Sri Lanka.

SURINAM

Registro de Datos 101

Fuente de Datos: (1) Mitro, S. Forthcoming. Country report of Suriname. In *Proceedings of the Seventh Sea Turtle Symposium for the Guianas (October 25–27, 2004).* Georgetown, Guyana. (2) Hilterman, M. L., Goverse, E., Tordoir, M. T., and H. A. Reichart. Forthcoming. Beaches come and beaches go: Coastal dynamics in Suriname are affecting important sea turtle rookeries. In *Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation: NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC.* (3) De Dijn, B. 2003. Country report of Suriname: Marine turtle season 2002. In *Proceedings of the Sixth Sea Turtle Symposium for the Guianas,* compilers I. Nolibos, L. Kelle, B. De Thoisy, and S. Lochon, 8–10. Remire–Montjoly, French Guiana.
Playa de Anidación: Playa Matapica (antiguamente Bigisanti) Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encontraron disponibles. Con base en tres décadas de monitorización de nidos en Surinam se sabe que la Playa Matapica (antes llamada Bigisanti) recibe 99 por ciento de todos los nidos de tortuga carey en el país. Los últimos datos disponibles datan del 2002 y el 2003, cuando se registraron 21 y 16 nidos respectivamente.
Contactos SWOT: Edo Goverse y Maartje Hilterman

TANZANÍA

Registro de Datos 102

Fuente de Datos: Muir, C. 2008. Hawksbill nesting in Tanzania: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Kilindoni, Isla Mafia
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de a Playa:** 2.5 km
Comentarios: la anidación de la tortuga carey en Tanzanía es rara.
Contacto SWOT: Catharine Muir

TAILANDIA

Registro de Datos 103

Fuente de Datos: Charuchinda, M., and S. Monanunsap. 1998. Monitoring survey on sea turtle nesting in the Inner Gulf of Thailand, 1994–1996. *Thailand Marine Fisheries Research Bulletin* 6:17–25.
Playa de Anidación: Isla Khram, Provincia de Chonburi
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encontraron disponibles. Los últimos datos disponibles son de 1996, cuando 42 nidos de tortuga carey fueron registrados durante patrullajes nocturnos diarios durante toda la temporada de anidación (mayo a agosto). De 1973 a 1996 se registró un promedio de 74 nidos de tortuga carey en este sitio. También se ha registrado la anidación esporádica en otras islas del Golfo de Tailandia incluyendo las Islas Man, Lan, Chang, Samet, y Thalu.

TRINIDAD Y TOBAGO

Registro de Datos 104

Fuente de Datos: Livingstone, S. R. 2006. *Sea Turtle Ecology and Conservation on the North Coast of Trinidad.* PhD diss., University of Glasgow, Scotland.
Playas de Anidación: 5 pequeñas bahías arenosas alrededor de Grande Riviere (costa norte), Trinidad
Longitud de la Playa: 50 km
Comentarios: Se calcula que 675 nidos de tortuga carey son depositados en este conjunto de playas cada año. Este cálculo se basa en los datos recolectados de abril a septiembre del 2000 al 2004 durante patrullajes de la costa completa durante dos o tres noches cada una o dos semanas. La temporada de anidación es de mayo a septiembre con el apogeo de anidación en julio y agosto.
Contacto SWOT: Suzanne Livingstone

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Registro de Datos 105

Fuente de Datos: (1) Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Fish and Wildlife Research Institute, Statewide Nesting Beach Survey Program. http://research.myfwc.com. (2) Brost, B. 2008. Hawksbill nesting in Florida, USA: Personal communication. In *SWOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008).
Playa de Anidación: Parque Estatal Bahia Honda, Condado de Monroe, Florida
Año: 2006 **Conteo:** 3 nidos **Longitud de la Playa:** 4.7 km
Esfuerzo de Monitorización: Los patrullajes diariosde la playa fueron llevados a cabo desde el 17 de abril al 1ro de septiembre del 2006. La anidación ocurre entre principios de agosto y mediados de octubre.
Playas de Anidación: Playas de Boca Ratón, Condado de Palm Beach, Florida
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 8 km

Playa de Anidación: Playa Breakers, Condado de Palm Beach, Florida
Año: 2006 **Conteo:** 1 nido **Longitud de la Playa:** 0.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Las playas antes mencionadas en el Condado de Palm Beach fueron patrulladas cada mañana desde el 1ro de marzo al 31 de octubre del 2006.
Contacto SWOT: Beth Brost

Registro de Datos 106

Fuente de Datos: Pacific Whale Foundation. *Sea Turtles: A Hawai'i Wildlife Guide.* http://www.pacificwhale.org.
Playas de Anidación: Playas en la Isla de Hawaii (Isla Grande), Isla Mau'i, Isla Moloka'i, e Isla O'ahu, Hawaii
Comentarios: Cada año son depositados aproximadamente entre 10 y 15 nidos de tortuga carey en el Estado de Hawaii. Noventa por ciento de la anidación ocurre en la costa Ka'u de la Isla de Hawai'i. La temporada de anidación ocurre desde mediados de mayo hasta finales de noviembre.
Contacto SWOT: George Balazs

ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Registro de Datos 107

Fuente de Datos: *NPS Buck Island Reef National Monument Sea Turtle Research Program Seasonal Report 2006.* St. Croix, U.S. Virgin Islands: National Park Service, Buck Island Reef National Monument, Division of Resource Management. Unpublished report.
Playas de Anidación: Monumento Nacional Arrecife Buck Island, St. Croix
Año: 2006 **Conteo:** 133 nidos confirmados, se sospechan otros 101 nidos
Longitud de la Playa: 1.5 km
Esfuerzo de Monitorización: Estas playas fueron patrulladas desde el 1ro. de julio al 30 de septiembre del 2006. La anidación ocurre durante todo el año con su apogeo de julio a octubre.
Contacto SWOT: Zandy Hillis-Starr e Ian Lundgren

VENEZUELA

Registro de Datos 108

Fuente de Datos: (1) Guada, H. 2008. Hawksbill nesting in Venezuela: Personal communication. In S*WOT Report—The State of the World's Sea Turtles,* vol. 3 (2008). (2) Guada, H. J., and G. Solé. 2000. *WIDECAST Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Venezuela.* Informe Técnico del PACNo. 39. Kingston, Jamaica: United Nations Environment Programme Caribbean Environment Programme.
Playas de Anidación: Playas a lo largo de la costa caribeña.
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no fueron disponibles. Estudios extensivos a finales de la década de los ochenta halló que las tortugas carey anidaban en números desconocidos en muchas playas a lo largo de la costa. Estudios adicionales a finales de los noventa y en años recientes han hallado una anidación dispersa en otras áreas de la costa. Se han registrado sitios de anidación de la tortuga carey en los siguientes estados y dependencias federales de Venezuela: Estado Anzoátegui, Estado Aragua, Estado Falcón, Estado Miranda, Estado Sucre, Estado Vargas, Isla de Aves, e Isla La Blanquilla.
Contacto SWOT: Hedelvy Guada

VIETNAM

Registro de Datos 109

Fuenete de Datos: Hamann, M., The Cuong, C., Duy Hong, N., Thuoc, P., and B. Thi Thuhien. 2006. Distribution and abundance of marine turtles in the Socialist Republic of Viet Nam. *Biodiversity and Conservation* 15: 3703–20.
Playas de Anidación: Golfo de Tonkin, Archipiélago Spratly, y Golfo de Tailandia
Comentarios: Los datos sobre la anidación del 2006 no se encontraron disponibles. Estudios recientes indican que menos de 10 nidos son depositados anualmente en Vietnam.

YAP, ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA

Registro de Datos 110

Fuente de Datos: Cruce-Johnson, J. 2006. *Yap State Sea Turtle Conservation Program, Ulithi Tagging Project, Gielop and Iar islands, Summer 2005.* Yap State, Federated States of Micronesia: *Marine Resources Management Division Report.* Unpublished report.
Playa de Anidación: Isla Gielop
Año: 2006 **Conteo:** 0 nidos
Comentarios: No se observó ninguna anidación por parte de la tortuga carey en el 2006. En el 2005 se observó una tortuga carey anidando, la cual fue marcada durante la anidación en la Isla Gielop. Se llevaron a cabo patrullajes nocturnos la mayoría de las noches desde el 9 de junio al 24 de agosto del 2005 y del 2 de junio al 20 de agosto del 2006.
Contactos SWOT: Jennifer Cruce y Wayne Sentman