Contributeurs de données pour SWOT

Définition des termes

Nids : Nombre relevé de nids creusés par les tortues imbriquées femelles pendant la période de suivi. Tous les nids ne contiennent pas forcément des œufs.

Femelles en ponte : Nombre observé de tortues imbriquées femelles en ponte pendant la période de suivi.

Montée : Arrivée d'une tortue imbriquée femelle sur la plage pour pondre. Le nombre peut inclure ou non les fausses montées.

Fausse montée : Arrivée sur la plage d'une tortue imbriquée femelle qui ne conduit pas à un nid.

Nids estimés : Estimation du nombre de nids de tortues imbriquées en une saison. Les méthodes d'estimation varient.

Effort de suivi : Niveau d'effort utilisé pour suivre l'activité de ponte sur une plage donnée.

Année : L'année de fin d'une saison de ponte donnée (par exemple, les données collectées entre fin 2005 et début 2006 portent la date de l'année 2006).

Citations des donnés sur les tortues imbriquées

Directives d'utilisation des données et de citation :

Les données de ponte des tortues imbriquées correspondent directement à la carte de ce rapport (pp. 12–13), organisées de manière alphabétique (sur la base du nom en anglais) par pays et nom de plage. Chaque relevé de données pointé sur la carte est numéroté de manière à correspondre à ce point. Ces données proviennent de nombreuses sources et n'ont parfois jamais été publiées. Les données peuvent être utilisées librement, mais leur source originale indiquée dans le champ « source de données » de chaque relevé doit être citée. Seules les données originales sont rapportées ici – et non les valeurs converties parfois utilisées sur la carte. Pour plus d'informations sur les conversions de données, voir l'article p. 11.

Dans les relevés ci-dessous, les données de ponte proviennent de la dernière saison complète de ponte de 2006 pour toutes les plages disponibles. Lorsque les données récentes ne sont pas disponibles, les dernières données disponibles sont présentées.

Note importante sur les citations de données sur les tortues imbriquées :

Un effort important à été consacré à chaque relevé de donnée afin d'en évaluer la qualité et la source. Si tout a été fait pour s'assurer de la fiabilité de telles données, nous ne pouvons pas garantir une exactitude absolue. Les informations sur les efforts de suivi et leur relativité par rapport à la saison de ponte sont indiquées le cas échéant pour permettre une évaluation plus complète des données.

ANGUILLA, TERRITOIRE D'OUTRE-MER BRITANNIQUE

Relevé 1

Source de données : Gumbs, J. 2008. Hawksbill nesting in Anguilla: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Barnes Bay, Cove Bay, Junk's Hole Bay, Limestone Bay, Long Bay, Mead's Bay, Mimi Bay, Savannah Bay, Windward Point, Sandy Hill Bay et Shoal Bay East
Année : 2006 **Nombre :** 1–5 nids estimés sur chaque plage

Plages de nidification : Blackgarden Bay et Captain's Bay
Année : 2006 **Nombre :** 5–10 nids estimés sur chaque plage
Commentaires : Actuellement, il n'y aucun programme de suivi des plages de ponte à Anguilla. Les nombres de nids sont des moyennes annuelles estimées sur la base des données historiques.
Contact de SWOT : James Gumbs

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Relevé 2

Source de données : Munhofen, J.and S. Ramirez. 2007. *Tagging and Nesting Research on Hawksbill Turtles (Eretmochelys imbricata) at Jumby Bay, Long Island, Antigua, West Indies.* Jumby Bay Hawksbill Project, WIDECAST. Rapport non publié.
Plage de nidification : Pasture Bay
Année : 2006 **Nombre :** 224 nids, 62 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 450 m
Effort de suivi : Toute la plage a fait l'objet de patrouilles nocturnes entre le 15 juin et le 15 novembre 2006. La saison de ponte va de juin à mi-novembre, avec un pic en août.
Contacts de SWOT : Peri Mason et Jim Richardson

ARUBA

Relevé 3

Source de données : Van der Wal, E., and R. Van der Wal, Turtugaruba (Aruban Foundation for Sea Turtle Protection and Conservation). 2008. Hawksbill nesting in Aruba. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Arashi
Année : 2006 **Nombre :** 0 nid
Longueur de la plage : 0,6 km
Effort de suivi : Des patrouilles matinales quotidiennes ont été effectuées sur toute la plage entre le 1er juin et le 15 octobre 2006. Aucune activité de ponte de tortue imbriquée n'a été relevée en 2006, mais on sait que les tortues imbriquées venaient pondre ici les années précédentes. La saison de ponte va de juin à novembre.

Plage de nidification : Baby
Année : 2006 **Nombre :** 5 nids
Longueur de la plage : 100 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit sur toute la plage ont été effectuées entre le 1er août 2006 et le 20 janvier 2007. La saison de nidification va de juin à novembre, avec un pic en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : Edith et Richard Van der Wal

AUSTRALIE

Relevé 4

Source de données : Limpus, C. J. and J. D. Miller. 2000. *Final Report for Australian Hawksbill Turtle Population Dynamics Project.* Queensland, Australia: Queensland Parks and Wildlife Service, and the Japan Bekko Association.
Plages de nidification : Albany Island, Aukane Island, Bet Island, Bourke Island, Boydong Island, Dadalai Island, Layoak Island, Mimi Island, Mt. Adolphus Island, Saddle Island, Zuizin Island, et une île sans nom, Queensland
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Les survols aériens associés au comptage sur le terrain en février 1997 ont permis de constater que 12 îles du détroit de Torres et du nord-est du Queensland accueillaient chacune 100 et 500 tortues imbriquées qui viennent pondre chaque année. Vingt-huit autres îles de la région avaient un nombre estimé entre 10 et 100 tortues imbriquées en ponte chaque année, et 27 autres îles de 1 à 10 femelle chaque année. Limpus et Miller (2000) estiment que la population totale de tortues imbriquées au Queensland était d'environ 4.000 femelles qui se reproduisaient chaque année.

Plages de nidification : Dayman Island, Hawkesbury Island et Long Island, détroit de Torres, Queensland
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Des survols aériens combinés à un comptage sur le terrain en février 2007 ont permis de constater que ces trois îles accueillaient chacune plus de 500 tortues imbriquées en ponte chaque année.

Plages de nidification : îles extérieures d'English Company le nord-est, nord-ouest et le sud-est de Groote Eylandt et des îles voisines, Nord-Est d'Arnhem Land, Territoire du Nord
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Des survols aériens associés à un comptage sur le terrain en 1997 ont permis d'estimer que 12 sites du nord-est d'Arnhem Land accueillent chaque année plus de 100 tortues imbriquées en ponte. La nidification sur ces plages et concentrée dans les quatre zones générales listées ci-dessus : les îles extérieures English Company, le partie nord-est de l'île de Groote Eylandt, la partie nord-ouest de l'île de Groote Eylandt et la partie sud-est de l'île de Groote Eylandt.

Relevé 5

Source de données : Pendoley, K., Howitt, L., Speirs, M., and A. Viternbergs. 2008. Hawksbill nesting in Australie-Occidentale. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : Plage de Bivalve, Pilbara, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 1 femelle baguée
Longueur de la plage : 0,6 km

Plage de nidification : Plage de Mushroom, Pilbara, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 1,2 km

Plage de nidification : YCN, Pilbara, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 1,1 km

Plage de nidification : YCS, Pilbara, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 2 femelles baguées
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des patrouilles nocturnes ont été effectuées sur chacune des plages citées ci-dessus du 22 novembre au 21 décembre 2006. La saison de ponte court de septembre à décembre, avec un pic en octobre et en novembre.

Plage de nidification : Rosemary Island, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 423 femelles baguées
Longueur de la plage : 2,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuits ont été effectuées du 13 au 27 octobre 2006. La saison de ponte court de septembre à décembre, avec un pic en octobre et en novembre.

Plage de nidification : Varanus Island, Australie-Occidentale
Année : 2006 **Nombre :** 22 femelles baguées
Longueur de la plage : 320 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées du 26 octobre au 9 novembre 2006. La saison de ponte court de septembre à décembre, avec un pic en octobre et en novembre.
Contact de SWOT : Kellie Pendoley

Relevé 6

Source de données : Bell, I. P. 2006. *Milman Island Nesting Studies 8th to 29th Janvier 2006*. Queensland Parks and Wildlife Service.
Plages de nidification : Cairncross Island, Crocodile Island, Douglas Island et Sinclair Island, Queensland
Commentaires : Ces îles près de Milman Island n'ont pas fait l'objet d'un suivi en 2006 mais sont connues pour accueillir une activité de ponte à faible densité de tortues imbriquées

Plage de nidification : Milman Island, Queensland
Année : 2006 **Nombre :** 229 nids confirmés, 112 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 2,4 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées du 8 au 29 janvier 2006. Ces chiffres doivent être considérés comme des valeurs minimales car la saison de ponte était déjà bien avancée avant que le suivi ne démarre.
Contacts de SWOT : Ian Bell, Kirstin Dobbs et Colin Limpus

BAHAMAS

Relevé 7

Source de données : (1) Bolten, A. 2008. Hawksbill nesting in Bahamas: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008). **(2)** Mortimer, J. A. and M. Donnelly. À paraître. *Eretmochelys imbricata*. In IUCN 2008, 2008 IUCN Red List of Threatened Species.
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n'étaient pas disponibles. Des pontes isolées à faible densité ont lieu dans environ 700 cayes des Bahamas. En l'absence d'un suivi, le nombre approximatif de nids de tortues imbriquées est estimé entre 500 et 1.000 dans l'archipel des Bahamas.
Contacts de SWOT : Karen Bjorndal et Alan Bolten

BARBADE

Relevé 8

Source de données : Horrocks, J., Krueger, B., and J. Beggs. 2008. Hawksbill nesting in Barbados. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Plage de Bath
Année : 2006 **Nombre :** 102 nids
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : La plage est patrouillée chaque matin pendant toute l'année. Le pic de ponte est de mai à septembre.

Plage de nidification : Plages de la côte Est
Année : 2006 **Nombre :** 59 nids
Longueur de la plage : 9 km
Effort de suivi : Les plages ont été patrouillées à un rythme hebdomadaire du 1er mars au 31 juillet 2006. Le pic de ponte se situe entre mars et juillet.

Plages de nidification : Plage de Needham's Point
Année : 2006 **Nombre :** 354 nids
Longueur de la plage : 1,1 km
Effort de suivi : En tant que plage de référence, elle était patrouillée chaque nuit, toute la nuit de mai à septembre, deux fois par nuit d'octobre à novembre et une fois par semaine de décembre à avril. Les pontes ont lieu toute l'année, avec un pic de mai à septembre.

Plages de nidification : Plages de la côte sud
Année : 2006 **Nombre :** 261 nids
Longueur de la plage : 4,5 km
Effort de suivi : Les plages de la côte sud ont été patrouillées deux fois par nuit lors du pic de la saison de ponte de mai à septembre, chaque nuit d'octobre à novembre et une fois par semaine de décembre à avril.

Plages de nidification : Plages de la côte ouest
Année : 2006 **Nombre :** 1.044 nids
Longueur de la plage : 22 km
Effort de suivi : Les plages de la côte ouest ont été patrouillées deux fois par nuit au pic de la saison de ponte de mai à septembre, chaque nuit d'octobre à novembre et une fois par semaine de décembre à avril.
Contacts de SWOT : Jen Beggs, Julia Horrocks et Barry Krueger

BELIZE

Relevé 9

Source de données : (1) Dow, W. E., and K. L. Eckert. 2007. *Sea Turtle Nesting Habitat – A Spatial Database for the Wider Caribbean Region*. Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST) et The Nature Conservancy. WIDECAST Technical Report No. 6. Beaufort, North Carolina. **(2)** Mortimer, J. A., and M. Donnelly. À paraître. *Eretmochelys imbricata*. In IUCN 2008, 2008 IUCN Red List of Threatened Species. **(3)** Smith, G. W. 1992. Hawksbill turtle nesting at Manatee Bar, Belize, 1991. *Marine Turtle Newsletter* 57:1–5.
Plages de nidification : Manatee Bar, Sapodilla Cays et South Water Caye
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Ces zones sont connues pour accueillir des pontes de tortues imbriquées.

BRÉSIL

Relevé 10

Source de données : Marcovaldi, M., Soares, L., and C. Bellini. 2008. Hawksbill nesting in Brazil. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Abaís, Pirambu et Ponta dos Mangues, État de Sergipe
Année : 2006 **Nombre :** 118 nids
Longueur de la plage : 125 km

Plages de nidification : Arembepe, Costa do Sauipe, Praia do Forte et Sitio do Conde, État de Bahía
Année : 2006 **Nombre :** 1159 nids
Longueur de la plage : 213 km

Plages de nidification : Pipa, État de Rio Grande do Norte
Année : 2006 **Nombre :** 240 nids
Longueur de la plage : 9 km
Effort de suivi : Pour toutes les plages citées ci-dessus, elles ont dans leur ensemble été patrouillées de jour et de nuit du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006. La saison de ponte court de début septembre à fin mars, avec un pic de décembre à février.
Contacts de SWOT : Claudio Bellini, Maria A. Marcovaldi et Luciano Soares

CAMEROUN

Relevé 11

Source de données : CEROCOMA et PROTOMAC. *Rapport des Activités*. Cameroun, Afrique centrale. Rapport non publié.
Plages de nidification : Plages au sud de la ville de Kribi
Année : 2006 **Nombre :** 0 nids
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée quotidiennement du 11 septembre 2005 au 30 avril 2006. La saison de ponte court de septembre à avril.
Contacts de SWOT : Alain Gibudi et Jules Ngunguim
Îles Caïmans, Territoire d'outre-mer britannique

Relevé 12

Source de données : Solomon, J., and J. Blumenthal. *Cayman Islands Government, Department of Environment Annual Marine Turtle Beach Monitoring Program 2006*. Rapport non publié.
Plage de nidification : Frank Sound, Grand Cayman
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids
Longueur de la plage : 1,43 km

Plage de nidification : Plage de Seven Mile, Grand Cayman
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 8,83 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée deux fois par semaine du 28 avril au 28 septembre 2006. La saison de ponte court de début mai à mi-juillet, avec un pic de mai à juillet.
Contacts de SWOT : Joni Solomon et Janice Blumenthal
Archipel des Chagos, Territoire d'outre-mer britannique

Relevé 13

Source de données : Mortimer, J. A., and M. Day. 1999. Sea turtle populations and habitats in the Chagos Archipelago. In C. R. C. Sheppard and M. R. D. Seaward, eds, 1999, *Ecology of the Chagos Archipelago*, Linnean Society Occasional Publications 2.
Plages de nidification : Archipel des Chagos
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Environ 300 à 700 nids de tortues imbriquées sont estimés chaque année dans l'archipel des Chagos. Le plus grand nombre se trouve sur les îles de Peros Banhos et Diego Garcia.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Le Groupe d'intérêt spécial pour la cartographie d'Environmental Systems Research Institute a récompensé Kellee Koenig, en charge de la coordination cartographique pour SWOT à Conservation International, pour la carte des « sites de nidification en 2005 des tortues caouannes dans le monde » publiée dans *Rapport SWOT, Vol. II*. Cette carte a été choisie parmi plus de 500 candidatures.

CHINE

Relevé 14

Source de données : (1) Cheng, I. J. 1995. Sea turtles at Dungsha Tao, South China Sea. *Marine Turtle Newsletter* 70:13–14. **(2)** Cheng, I. J. 1996. Sea turtles at Taipin Tao, South China Sea. *Marine Turtle Newsletter* 75: 6–8. **(3)** Liang, Y. L., Dai, Y. R., Liu, Y. Q., Liu, S. Y., Wan, X. J., Song, Z. H., Chen, D. T., et al. 1990. The investigation of sea turtle resources in the South China Sea and the development of artificial hatching techniques for sea turtles. In *Report of the South China Sea Turtle Resources Conservation Station, Major Research Project of the Aquaculture Department*. China: Bureau of Agriculture.
Plage de nidification : Donsha, Taïwan
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Le dernier relevé de ponte date de 1995 : 5 nids et traces de montées ont été trouvés lors d'inventaires de nuit. La saison de ponte court de mai à octobre.

Plage de nidification : Qilianyu, archipel de Xhisha
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour pondre en nombre limité sur cette plage.
Plage de nidification : Taipin Tao, archipel de Nan-sha, Taïwan
Commentaires : C'est une île sous contrôle militaire et les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les inventaires réalisés en 1996 ont permis de montrer que les tortues imbriquées nidifiaient sur ces plages.
Contact de SWOT : I-Jiunn Cheng

COLOMBIE

Relevé 15

Source de données : Patiño-Martinez, J., and L. Quiñones. 2008. Hawksbill nesting in Colombia: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Acandi-Chilingos, Capitancito, Playeta, Playona et Pueblo Nuevo
Commentaires : Chacune de ces plages accueille une activité de ponte non déterminée, à partir de mai jusqu'à une date non spécifiée. Ces informations ont été déterminées par des comptages de traces et des entretiens avec les habitants locaux.
Contacts de SWOT : Juan Patiño Martinez et Liliana Quiñones

Relevé 16

Source de données : Pavia, A., and C. Monterrosa. 2008. Hawksbill nesting in Tayrona National Park, Colombia. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Arrecifes, Parc national de Tayrona, Magdalena
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids, 11 montées
Longueur de la plage : 2,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée d'avril à septembre 2006. La saison de ponte court de mai à septembre, avec un pic en juillet et en août.
Contacts de SWOT : Carolina Monterrosa et Alejandro Pavia

COSTA RICA

Relevé 17

Source de données : Gaos, A. R., Yañez, I. L., and R. M. Arauz. 2006. *Sea Turtle Conservation and Research on the Pacific Coast of Costa Rica*. Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA). Technical Report.
Plage de nidification : Refuge national de faune sauvage de Caletas-Ario
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids
Longueur de la plage : 5 km

Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit tous les soirs du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006.
Contacts de SWOT : Alexander Gaos et Ingrid Yañez

Relevé 18
Source de données : Hutchinson, A. 2008. Hawksbill nesting on Playa Camaronal, Costa Rica: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Refuge national de faune sauvage de Camaronal
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Camaronal est connu pour accueillir des tortues imbriquées en ponte de manière sporadique à raison de un à deux nids par an.
Contact de SWOT : Alec Hutchinson

RELEVÉ 19
Source de données : Chacón-Chaverrí, D. 2008. Hawksbill nesting in Costa Rica: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Isla Uvita, Limón
Année : 2006 **Nombre :** 1–2 nids par an

Plage de nidification : Parc national de Manuel Antonio
Année : 2006 **Nombre :** 1–2 nids par an

Plage de nidification : Playa Cahuita
Année : 2006 **Nombre :** 25–75 nids par an

Plage de nidification : Playa Gandoca
Année : 2006 **Nombre :** 15–25 nids par an

Plage de nidification : Playa Pacuare
Année : 2006 **Nombre :** 1–2 nids par an

Plage de nidification : Playa Platanares, péninsule d'Osa
Année : 2006 **Nombre :** 1–3 nids par an

Plage de nidification : Punta India to Rayo, Guanacaste
Année : 2006 **Nombre :** 1–2 nids par an

Plage de nidification : Rio Oro, Péninsule d'Osa
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid estimé par an
Commentaires : la partie Pacifique du Costa Rica accueille des pontes sporadiques de tortues imbriquées.
Contact de SWOT : Didiher Chacón

Relevé 20
Source de données : Piedra, R. 2008. Hawksbill nesting on Playa Langosta, Costa Rica: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Playa Langosta, Parc national marin de Las Baulas, Guanacaste
Année : 2006 **Nombre :** 0 nid
Longueur de la plage : 1,3 km
Commentaires : Les derniers relevés de nids de tortues imbriquées sur Playa Langosta datent de 2003 (2 nids).
Contact de SWOT : Rotney Piedra

Relevé 21
Source de données : Venegas, R. *2006. Report of Activities and Research in Pacuare Reserve, 2006 Season*. Pacuare Reserve Marine Turtle Conservation Project, Playa Mondonguillo. Endangered Wildlife Trust. Rapport non publié.
Plage de nidification : Playa Mondonguillo, province de Limón
Année : 2006 **Nombre :** 2 nids, 5 femelles en ponte
Longueur de la plage : 5,7 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée chaque soir du 28 février au 30 septembre 2006.
Contact de SWOT : Ruben Venegas

Relevé 22
Source de données : Castro-Morales, C., and F. Campos-Rodriguez. 2006. *Final Report: Research and Protection of the Leatherback, Green and Hawksbill Turtles of the Parismina River Mouth*. Asociación Salvemos Las Tortugas de Parismina. Rapport non publié.
Plage de nidification : Playa Parismina, province de Limón
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 5,6 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée chaque nuit du 15 février au 15 octobre 2006. La saison de ponte court de mai à août.
Contact de SWOT : Vicky Taylor

En août 2007, SWOT a été sélectionné pour recevoir une subvention de Google pour pouvoir bénéficier de publicité gratuite sur Internet à travers Google AdWords. Cette subvention à permis à SWOT de mieux faire connaître *Rapport SWOT - The State of the World's Sea Turtles* au public et d'augmenter le nombre de visites sur son propre site web.

Relevé 23
Source de données : De Haro, A., et al. 2007. *Report on the 2006 Green Turtle Program at Tortuguero, Costa Rica*. Caribbean Conservation Corporation. Rapport non publié.
Plage de nidification : Playa Tortuguero, Parc national de Tortuguero
Année : 2006 **Nombre :** 14 femelles en ponte
Longueur de la plage : 29 km
Effort de suivi : Environ 8,0–14,5 kilomètres de plages ont été patrouillées chaque nuit du 5 mars au 31 octobre 2006. La saison de ponte court d'avril à novembre avec un pic en mai et en juillet.
Contact de SWOT : Emma Harrison

CÔTE D'IVOIRE
Relevé 24
Source de données : Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa*. CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : Plages de Balmar et Many-Dodo
Commentaires : Selon les pêcheurs locaux, les tortues imbriquées pondent sur cette plage. Les chiffres ne sont pas connus mais supposés faibles.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

CUBA
Relevé 25
Source de données : (1) Moncada, F., Carrillo, E., Saenz, A., and G. Nodarse. 1999. Reproduction and nesting of hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata*, in the Cuban Archipelago. *Chelonian Conservation and Biology*, vol. 3, no. 2 (1999). **(2)** Moncada, F., Nodarse, G., Medina, Y., and E. Escobar. 2006. *Annual Report on Hawksbill Turtle* (Eretmochelys imbricata) *Research in Cuba (Février 2006–Février 2007)*. Cuba: Marine Turtle Project, Fisheries Research Center. **(3)** Moncada, F. 2008. Hawksbill nesting in Cuba: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Playas del Laberinto de las Doce Leguas, provinces de Camaguey et Ciego de Avila
Année : 2006 **Nombre :** 120 nids
Longueur de la plage : 37,71 km
Effort de suivi : Des patrouilles ont été effectuées sur les plages du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007. La saison de ponte court d'octobre à janvier avec un pic en novembre.
Commentaires : Les tortues imbriquées pondent dans tout l'archipel de Cuba, sur plusieurs sites où le suivi est impossible. Selon des estimations antérieures, 2.000 à 2.500 nids sont creusés chaque année à Cuba. Cependant, ces estimations ne sont pas à jour et devraient sans doute être révisées.
Contact de SWOT : Félix Moncada

DOMINIQUE
Relevé 26
Source de données : Byrne, R. 2008. Hawksbill nesting in Dominica: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Bodega Bay, Plage de Cabana / London-derry, Plage de Hamstead, Plage de Marigot et Woodford Hill
Année : 2006 **Nombre :** 10–15 nids par an sur chaque plage
Longueur de la plage : Chaque plage est inférieure à 1 km à l'exception de la Plage de Cabana / Londonderry, légèrement inférieure à 3 km.

Plages de nidification : Plage de Castaways, Castle Bruce, Donkey, La Plaine-Bout Sable, Maho Beach, Massace, Petit Soufiere, Point Michele, Pottersville Roseau, Rockaway, Rosalie, Scotts Head et Soufiere
Année : 2006 **Nombre :** 1–5 nids par an sur chaque plage

Plages de nidification : Plages de Dublanc, Macousirie, Portsmouth, Salisbury et Toucarie
Année : 2006 **Nombre :** 5–10 nids par an sur chaque plage
Contact de SWOT : Rowan Byrne

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Relevé 27
Source de données : Tomás, J., León, Y. M., Feliz, P., Geraldes, F. X., Broderick, A. C., Fernández, M., Godley, B. J., and J. A. Raga. 2007. Sea turtle nesting populations of the Dominican Republic. In *14th European Congress of Herpetology, Porto (Portugal), 19–23 September 2007*. Book of abstracts.
Plage de nidification : Parc national de Jaragua
Année : 2006 **Nombre :** 23 nids
Effort de suivi : Les données ont été collectées à l'aide d'inventaires intensifs et des entretiens en 2006. Ces inventaires constituent les premiers inventaires systématiques de l'activité de ponte des tortues imbriquées en République dominicaine depuis plus de 25 ans. La saison de ponte court de juillet à novembre.
Commentaires : Le prélèvement illégal d'œufs sur ce site était presque de 100 pour cent.

Plage de nidification : île de Saona, Parc national de l'Est
Année : 2006 **Nombre :** 62 nids
Effort de suivi : Les données ont été collectées à l'aide d'inventaires intensifs et des entretiens en 2006. Ces inventaires constituent les premiers inventaires systématiques de l'activité de ponte des tortues imbriquées en République dominicaine depuis plus de 25 ans. La ponte a lieu toute l'année sur ce site.
Commentaires : Le prélèvement illégal d'œufs sur ce site était d'environ 50 pour cent. Ces inventaires ont permis de détecter une activité de ponte de faible intensité (1–4 nids par saison) sur 10 autres sites de la République dominicaine.
Contact de SWOT : Jesús Tomás

ÉQUATEUR
Relevé 28
Source de données : Zarate, P. 2008. Hawksbill nesting in Ecuador: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : La Playita de Salango, Las Playitas de los Frailes, Las Tunas, Machalilla et Playa Cerro Viejo.
Commentaires : La ponte des tortues imbriquées est sporadique en Équateur, avec une activité limitée chaque année sur ces plages.
Contact de SWOT : Patricia Zarate

GUINÉE ÉQUATORIALE
Relevé 29
Source de données : Rader, H., and G. Hearn. 2008. Hawksbill nesting on Île de Bioko, Equatorial Guinea. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Plage A, île de Bioko
Année : 2006 **Nombre :** 0 nids
Longueur de la plage : 1,78 km

Plage de nidification : Plage B, Île de Bioko
Année : 2006 **Nombre :** 0 nids
Longueur de la plage : 3 km

Plage de nidification : Plage C, Île de Bioko
Année : 2006 **Nombre :** 2 nids
Longueur de la plage : 3,34 km

Plage de nidification : Plage D, Île de Bioko
Année : 2006 **Nombre :** 0 nids
Longueur de la plage : 3,41 km

Plage de nidification : Plage E, Île de Bioko
Année : 2006 **Nombre :** 0 nids
Longueur de la plage : 4,11 km
Effort de suivi : les plages ont été patrouillées chaque nuit du 9 octobre 2005 au 30 avril 2006. La saison de ponte court d'octobre à avril avec un pic en décembre et en janvier.
Contacts de SWOT : Gail W. Hearn et Heidi Rader

Relevé 30
Source de données : Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa*. CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : Plages continentales d'Iduma à Etembue et de Nendyi à Cabo San Juan
Commentaires : Des tortues imbriquées en ponte ont été rapportées sur ces sites. Les chiffres ne sont pas connus.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

ÉRYTHRÉE
Relevé 31
Source de données : Goitom, M., Teclemariam, Y., and T. Mengstu. 2006. *Field Trip Report on Sea Turtle Nesting*

© AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE MAHTA GOITOM

Noms: Mahta Goitom, Yohannes Teclemariam et Tekle Mengstu
Projet: Biodiversité insulaire et marine côtière de l'Érythrée
Lieu: Massawa, Érythrée

Notre projet a découvert que 109 sites de la mer Rouge érythréenne accueillaient des pontes de tortues imbriquées. Notre but était de faire une synthèse de l'état des populations de tortues marines en Érythrée et fournir des recommandations de conservation aux autorités en charge du littoral et du milieu marin. Notre projet s'est achevé en décembre 2007 mais nous espérons que notre travail servira à stimuler des efforts durables pour la conservation et l'étude des tortues marines de notre pays.

Assessment on the Islands of Mojeidi and Aucan. Massawa, Eritrea: Ministry of Fisheries. Rapport non publié.
Plage de nidification : île d'Aucan
Année : 2006 **Nombre :** 735 nids
Longueur de la plage : 6,5 km
Effort de suivi : Ces données proviennent d'un comptage unique les 1 et 2 juin 2006. La saison de ponte court de début décembre à fin juin avec un pic en février et en mars.

Plage de nidification : île de Mojeidi
Année : 2006 **Nombre :** 840 nids, 47 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 5,8 km
Effort de suivi : La plage a fait l'objet d'un inventaire dans sa totalité du 18 mai au 3 juin 2006. La saison de ponte court de début décembre à fin juin avec un pic en février et en mars.
Contacts de SWOT : Mahta Goitom, Tecle Mengstu et Yohannes Teclemariam

FIDJI

Relevé 32
Source de données : Batibasaga, A., and N. Nand, Fiji Fisheries Department. 2008. Hawksbill nesting in Fiji. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Kiuva Beach, Tailevu, Viti Levu
Année : 2006 **Nombre :** 130 bébés
Commentaires : Cette plage ne fait pas l'objet d'un suivi régulier. Ces données proviennent d'une découverte unique le 20 février 2006.

Plage de nidification : Makogai Island, province de Lomaviti
Année : 2006 **Nombre :** 5 nids
Effort de suivi : La plage a été patrouillée sur une base hebdomadaire de décembre 2005 au 31 janvier 2006. Le pic de ponte est de novembre à février.

Plages de nidification : Hatana Island, Rotuma et South Sea Islands et Treasure Island dans le groupe d'îles des Mamanuca
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n'étaient pas disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour nidifier sur ces plages en faible densité.
Contacts de SWOT : Aisake Batibasaga et Neema Nand

GUYANE FRANÇAISE

Relevé 33
Source de données : Kelle, L. 2008. Hawksbill nesting in French Guiana: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Commentaires : Les tortues imbriquées pondent en faible densité en Guyane française, avec moins de 20 nids par ans relevés sur toute la côte. La plus forte densité est enregistrée près de Cayenne, avec environ 2–10 nids par an.
Contact de SWOT : Laurent Kelle

GABON

Relevé 34
Source de données : Verhage, B., Moundjim, E. B., and S. R. Livingstone. 2006. *Four Years of Marine Turtle Monitoring in the Gamba Complex of Protected Areas, Gabon, Central Africa, 2002–2006*. Gabon: WWF.
Plage de nidification : Pont Dick, Complexe de Gamba
Année : 2006 **Nombre :** 0 nid
Longueur de la plage : 5,75 km
Commentaires : Cette plage accueille une activité de ponte occasionnelle de tortues imbriquées à faible densité. En 2003–04, trois nids ont été relevés, et 0 en 2004–05.
Contact de SWOT : Bas Verhage

GRENADE

Relevé 35
Source de données : Lloyd, C., Ocean Spirits. 2008. Hawksbill nesting in Grenada: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Caille Beach, Caille Island
Année : 2006 **Nombre :** 6 femelles en ponte
Longueur de la plage : 350 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées du 22 juillet au 15 août 2006. La saison de ponte court de juillet à octobre, avec un pic en juin et en juillet.
Contact de SWOT : Carl Lloyd

GUADELOUPE, DÉPARTEMENT FRANÇAIS D'OUTRE-MER

Relevé 36
Source de données : Delcroix, E. 2006. *Rapport d'Activité Gestion du Réseau Tortues Marines de Guadeloupe 2006*. Rapport non publié.
Plages de nidification : plages d'Anse à Sable, Côte Sous le Vent Bouillante, Galets Rouges, Machette et Malendure, île de Basse-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 19 nids
Longueur de la plage : 0,7 km
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées lors d'inventaires de nids et comptages de traces du 14 mai au 14 septembre 2006. La saison de ponte court de mai à fin septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : Plage de Cluny, île de Basse-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : des inventaires de nids et des comptages de traces ont été effectués deux fois par semaine du 1er avril au 15 juillet 2006. La saison de ponte court de mai à fin septembre.

Plages de nidification : Plages de Figuier, Grande Anse et Pompierre, îles de Terre-de-Haut des Saintes
Année : 2006 **Nombre :** 12 nids
Longueur de la plage : 1,7 km
Effort de suivi : Ces plages ont fait l'objet d'un inventaire des traces trois fois par semaine du 1er mai au 1er octobre 2006. La saison de nidification court de mai à fin septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plages de nidification : Plages de Folle Anse and Trois-Ilets, île de Marie Galante
Année : 2006 **Nombre :** 231 nids
Longueur de la plage : 3,7 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit ont été effectués des 10 au 30 juin et du 6 au 26 août 2006, ainsi que des patrouilles occasionnelles de nuit à d'autres périodes.

Plages de nidification : Grande Anse Deshaies, Plage de La Perle et Plage Naturiste, île de Basse-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 0 nid sur chaque plage
Longueur de la plage : 1,4 km, 0,9 km, et 200 m, respectivement
Effort de suivi : Différents comptages de traces ont été effectués du 1er avril au 15 juillet 2006. La saison de ponte court de mai à fin septembre.

Plage de nidification : Grande Anse Trois-Rivières, île de Basse-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des inventaires réguliers de nuit ont été effectués deux fois par semaine du 1er avril au 30 septembre 2006. Des comptages de traces ont été effectués seulement en août et en septembre. La saison de ponte court de mai à fin septembre.

Plage de nidification : île de Petite-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 53 montées
Longueur de la plage : 4,6 km
Effort de suivi : La plage a dans son ensemble fait l'objet d'un inventaire des traces deux fois par semaine du 15 mars au 15 novembre 2006. La saison de ponte va de mai à fin septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : Plage du Four à Chaux, îlet Fajou
Année : 2006 **Nombre :** 78 montées
Longueur de la plage : 0,8 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a fait l'objet d'un inventaire hebdomadaire des traces du 22 avril au 15 septembre 2006. La saison de ponte va de mai à fin septembre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : Pointe des Châteaux, île de Basse-Terre
Année : 2006 **Nombre :** 30 nids
Longueur de la plage : 10,2 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a été patrouillée lors d'inventaires de nuit et des comptages de traces du 1er mai au 30 septembre 2006. La saison de ponte va de mai à fin septembre, avec un pic en juillet et en août.
Contact de SWOT : Eric Delcroix

GUAM

Source de données : Wusstig, S. 2008. Hawksbill nesting in Guam: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Commentaires : Selon les rapports, les tortues imbriquées pondaient à Guam en 1995. Les efforts de suivi des années récentes n'ont pas pu mettre en évidence d'autres pontes de tortues imbriquées.
Contact de SWOT : Shawn Wusstig

GUATEMALA

Relevé 37
Source de données : Fundación Mario Dary Rivera, Consejo Nacional de Áreas Protegidas and The Nature Conservancy. 2006. *Plan de Conservación de Área 2007–2011 Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique*. Guatemala: FUNDARY-PROARCA-TNC.
Plage de nidification : Punta de Manabique
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2005; à cette occasion, 10 nids ont été trouvés et déplacés vers une écloserie locale.

GUINÉE

Relevé 38
Source de données : Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa*. CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : Plages de l'île Blanche Island, île Cabri, île Roume et île Tamara à Los Islands
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Une faible activité de ponte de tortues imbriquées a été observée sur chacune de ces îles.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

GUINÉE-BISSAU

Relevé 39
Source de données : (1) Barbosa, C., Broderick, A., and P. Catry. 1998. Marine turtles in the Orango National Park (Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau). *Marine Turtle Newsletter* 81: 6–7. **(2)** Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa*. CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : îles éparses du parc national d'Orango, archipel des Bijagós
Commentaires : Des pontes de tortues imbriquées a été notée sur différentes îles de l'archipel des Bijagós, notamment Adonga, Baia las Escaramuças, Cavalos, Meio, Poilão et Uité. Le chiffre annuel n'est pas connu, mais sans doute faible.

GUYANA

Relevé 40
Source de données : Kalamandeen, M., DeFreitas, R., Stewart, K., and P. Pritchard, 2006. *Aspects of Marine Turtle Nesting in Guyana, 2006*. Guianas Forests and Environmental Conservation Project (GFECP). World Wildlife Fund: Rapport technique.
Plages de nidification : Plages d'Almond, Annette, Luri et Tiger
Année : 2006 **Nombre :** 10 femelles en ponte, 3 fausses montées
Longueur de la plage : 140 km au total
Effort de suivi : des patrouilles nocturnes sur environ 25 pour cent des plages ont été effectuées du 4 mars au 28 août 2006. La saison de ponte court de début mars à fin août, avec un pic en mai et juin.
Contact de SWOT : Michelle Kalamandeen

HONDURAS

Relevé 41

Source de données : *Aronne, M. 2000. Anidación Semiartificial para la Conservación de Tortuga Marina Carey (*Eretmochelys imbricata*) en el Área Protegida de Cayos Cochinos, del 18 Junio al 30 Octubre 2000*. Fundación Hondureña para los Arrecifes Coralinos (HCRF).
Plage de nidification : Cochinos Cays
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2000; à cette occasion, 10 nids ont été relevés lors d'inventaires du 18 juin au 30 octobre.

INDE

Relevé 42

Source de données : Andrews, H., Krishnan, S., and P. Biswas. 2006. *The Status and Distribution of Marine Turtles Around the Andaman and Nicobar Archipelago*. India: Andaman and Nicobar Islands Environmental Team, Center for Herpetology / Madras Crocodile Bank Trust.
Plage de nidification : Plages des îles Andaman
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les sites de ponte les plus importants des îles Andaman comprennent Snark Islands, South Reef Island, et North Brother Island. Parmi les autres sites se trouvent les îles Trilby, Temple, Smith, Ross et Sound au large de North Andaman Island; North Passage Island; North Button Island; Middle Button Island; Inglish Island; Neil and Sir Hugh Rose Islands et Baratang Island.

Plage de nidification : île de la Petite Andaman
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sontpas disponibles. La ponte de tortues imbriquées est connue sur plusieurs plages.

Plage de nidification : Parc national marin Mahatma Ghandi, South Andaman Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les tortues imbriquées sont connues pour avoir pondu sur les îles de Jolly Boy, Grub, Boat et Tarmugli dans le parc.

Plages de nidification : Plages des îles Nicobar
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Onze plages des îles Nicobar sont connues pour avoir accueilli une activité de ponte des tortues imbriquées.
Contacts de SWOT : Harry Andrews et Manish Chandi

INDONÉSIE

Relevé 43

Source de données : Putra, K. S. 2005. *Brief Overview of Turtle Conservation in Indonesia (May 2005)*. Rapport non publié.
Plage de nidification : Bantul, Yogyakarta
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2002 : l'observation a été faite de trois tortues imbriquées en ponte. Le nombre annuel de tortues imbriquées en ponte n'est pas disponible.

Plage de nidification : îles Natuna et Anambas, îles Riau
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées pontent dans ces îles.

Plage de nidification : Plage de Ngagelan, Parc national d'Alas Purwo, Java Est
Longueur de la plage : 19 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2004 : 10 tortues imbriquées en ponte avaient été observées. Le nombre annuel de tortues imbriquées en ponte n'est pas disponible.

Plage de nidification : Perancak, Bali
Longueur de la plage : 3 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2004 : 3 tortues imbriquées en ponte avaient été observées. Le nombre annuel de tortues imbriquées en ponte n'est pas disponible.

Plage de nidification : Pulau Banyak, Sumatra Nord
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n'étaient pas disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées pondent dans ces îles.
Contact de SWOT : Ketut Sarjana Putra

Relevé 44

Source de données : Everlasting Nature of Asia. *Project in Indonesia*. http://www.elna.or.jp/en/pj_id/index.html.
Plage de nidification : île Momperang, îles Momperang
Année : 2006 **Nombre :** 50–150 nids estimés
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification : île Pesemut, îles Momperang
Année : 2006 **Nombre :** 100–200 nids estimés
Longueur de la plage : 1.5 km

Plage de nidification : île Segama Besar
Année : 2006 **Nombre :** 150–250 nids estimés
Longueur de la plage : 1.4 km

Plage de nidification : île Segama Kecil
Année : 2006 **Nombre :** 100–150 nids estimés
Longueur de la plage : 1 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles pour les quatre plages citées ci-dessus. Il est reconnu que les tortues imbriquées ponde sur ces îles. Ces estimations sont basées sur les efforts passés de suivi à des degrés variables.
Contact de SWOT : Hiroyuki Suganuma

IRAN

Relevé 45

Source de données : Mobaraki, A. 2006. *Report on Sea Turtle Tagging Program in Iran*. Bureau of Wildlife and Aquatic Affairs, Department of the Environment. Rapport non publié.
Plage de nidification : île Hendourabi, province d'Hormozgan
Année : 2006 **Nombre :** 25 femelles baguées, >100 montées
Longueur de la plage : Environ 5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit du 14 au 19 avril 2006. La saison de ponte va de mars à mai, avec un pic en avril.

Plage de nidification : île Nakhiloo, province de Booshehr
Année : 2006 **Nombre :** 34 femelles baguées, >100 montées
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit du 26 au 31 mai 2006. La saison de ponte court d'avril à juin, avec un pic en mai.

Plage de nidification : île Ommolkaram, province de Booshehr
Année : 2006 **Nombre :** 32 femelles baguées, >100 montées
Longueur de la plage : 10 km
Effort de suivi : deux kilomètres de plages ont été patrouillées de nuit du 1er au 5 juin 2006. La saison de ponte court d'avril à juin, avec un pic en mai.

Plage de nidification : île Shidvar, province d'Hormozgan
Année : 2006 **Nombre :** 21 femelles baguées, >100 montées
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit du 1er au 14 avril 2006. La saison de ponte va de mars à mai, avec un pic en avril.
Contact de SWOT : Asghar Mobaraki

JAMAÏQUE

Relevé 46

Source de données : (1) Tennant, M. 2008. Hawksbill nesting on Gibraltar Beach, Jamaica. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008). **(2)** Harker, T. 2006. *Status and Conservation of Sea Turtles in Jamaica*. Rapport non publié.
Plage de nidification : plage de Gibraltar, Oracabessa, St. Mary
Année : 2006 **Nombre :** 26 nids
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit et chaque matin du 6 avril jusqu'en décembre 2006. La saison de ponte court d'avril à novembre, avec un pic en juillet et août.

Plage de nidification : zone d'Hellshire et Portland Bight Cays
Année : 2006 **Nombre :** 102 nids
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée deux fois par semaine du 1er mai au 26 octobre 2006. L'activité de ponte a lieu toute l'année avec un pic de juillet à septembre.
Contacts de SWOT : Shakira Azan et Andrea Donaldson

JAPON

Relevé 47

Source de données : Sea Turtle Association of Japan. 2006. Sea turtle data in 2006: Nesting of hawksbill turtles in 2006. In *Proceedings of the 17th Japan Sea Turtle Symposium*. Novembre 18–20, 2006, Kumano Shichirimihama, Japan. Japan: Sea Turtle Association of Japan.
Plage de nidification : île Ishigakishima
Année : 2006 **Nombre :** 1–10 nids
Contacts de SWOT : Irene Kinan et Yoshi Matsuzawa

Rapport SWOT, Vol. II a été choisi parmi plus de 10.000 entrées pour apparaître dans le numéro de *Graphic Design USA* de décembre 2007, un magazine annuel présentant les meilleures publications de l'année en termes de conception graphique.

ILE JUAN DE NOVA, TERRITOIRE FRANÇAIS D'OUTRE-MER

Relevé 48

Source de données : Bourjea, J., and S. Ciccione. 2008. Hawksbill nesting in French Overseas Territories: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Juan de Nova et d'autres îles éparses
Année : 2006 **Nombre :** 10 traces
Longueur de la plage : 7 km
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées quotidiennement du 1er janvier au 31 décembre 2006. La saison de ponte court de novembre à janvier, avec un pic en décembre.
Contacts de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane Ciccione

KENYA

Relevé 49

Source de données : Olendo, M. 2008. Hawksbill nesting in Kenya: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Kongowale
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid confirmé
Commentaires : En mai 2006, une ponte de tortue imbriquée a eu lieu sur cette plage. La nidification des tortues imbriquées est très sporadique au Kenya.
Contact de SWOT : Mike Olendo

LIBERIA

Relevé 50

Source de données : Save My Future Foundation (SAMFU). 2008. Hawksbill nesting in Liberia: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Bafu Bay, Sinoe County
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Lors de la saison de ponte 2006–2007, sept nids de tortues imbriquées ont été relevés entre le 15 novembre 2006 et le 15 septembre 2007.

Plage de nidification : Borgor Point, Rivercess County
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Lors de la saison de ponte 2006–2007, huit nids de tortues imbriquées ont été relevés entre octobre 2006 et avril 2007.
Contact de SWOT : Alex Peal

MADAGASCAR

Relevé 51

Source de données : Bourjea, J., Ciccione, S. and R. Rantsimbazafy. 2006. Marine turtle survey in Nosy Iranja Kely, northwestern Madagascar. *Western Indian Ocean Journal of Marine Science*, 5(2): 209–212.
Plage de nidification : île d'Iranja Kely, Nosy Be
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 2003 à 2004 : 28 nids avaient été trouvés. Ces plages ont été patrouillées de nuit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, produisant une observation estimée à 20 nids par an. La saison de ponte des tortues imbriquées court de décembre à mars, avec un pic en décembre et en janvier.
Contact de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane Ciccione

MALAISIE

Relevé 52

Source de données : Wagiman, S., Malaysia Fisheries Department. 2008. Hawksbill nesting in Johor, Malacca, Pahang, and Terengganu, Malaysia. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Cherating, État de Pahang

Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 3,5 km
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée de nuit de février à octobre 2006. La saison de ponte court d'avril à octobre.

Plages de nidification : Plages de l'État de Malacca
Année : 2006 **Nombre :** 388 nids
Longueur de la plage : 20 km
Effort de suivi : Ces données ont été collectées lors de patrouilles de nuit toute l'année par des collecteurs d'œufs licenciés. Sur l'île d'Upeh, des patrouilles de nuit ont été effectuées par le personnel de WWF Malaisie entre avril et août et par des collecteurs d'œufs licenciés lors des basses saisons. La ponte a lieu toute l'année avec un pic d'avril à août.
Commentaires : C'est un nombre global pour toutes les zones de Malacca, incluant particulièrement les plages autour de Kampung Padang Kemunting, Kem Terendak, Kuala Linggi et l'île d'Upeh.

Plages de nidification : Plage de Mak Kepit et de Mak Simpan, Pulau Redang, État de Terengganu
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids
Longueur de la plage : 450 m
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées sur les deux plages d'avril à octobre 2006.

Plages de nidification : îles de Mersing, État de Johor
Année : 2006 **Nombre :** 39 nids
Effort de suivi : La plage a été partiellement patrouillée de nuit de mars à septembre 2006. La saison de ponte court d'avril à août.
Contacts de SWOT : Eng-Heng Chan et Sukarno Wagiman

Relevé 53
Source de données : Bali, J., Sarawak Forestry Corporation. 2008. Hawksbill nesting in Sarawak, Malaysia. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Pulau Satang Besar, Sarawak
Année : 2006 **Nombre :** 10 nids
Longueur de la plage : 150 m
Effort de suivi : Des inventaires de nuit sur la toute la plage ont été effectuées toute l'année. Les pontes ont lieu toute l'année avec un pic de décembre à mars.
Contacts de SWOT : James Bali et Eng-Heng Chan

Relevé 54
Source de données : Sabah Department of Wildlife. 2008. Hawksbill nesting in Sabah, Malaysia. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de Lankayan, Sabah
Année : 2006 **Nombre :** 45 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit sur la toute la plage ont été effectuées toute l'année. Les pontes ont lieu toute l'année avec un pic de juin à juillet.
Contact de SWOT : Eng-Heng Chan

Relevé 55
Source de données : Marine Research Unit, Sabah Parks. 2007. *Turtle Islands Park and Sipadan Island Turtle Research Report*. Rapport non publié.
Plages de nidification : plages de Sabah Turtle Islands, Sabah
Année : 2006 **Nombre :** 514 nids
Longueur de la plage : 2,7 km
Effort de suivi : Des inventaires de nuit ont été effectués toute l'année sur ces plages. Les pontes ont lieu toute l'année, avec un pic de février à avril et de juin à juillet.

Plage de nidification : île de Sipadan, Sabah
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 1,7 km
Effort de suivi : des inventaires de nuit de toute la plage ont été effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2006. La saison de ponte court de janvier à juin.
Contact de SWOT : Fazrullah Rizally

MALDIVES

Relevé 56
Source de données : Zahir, H. 2008. Hawksbill nesting in Maldives: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Dharaboodhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1999 : sept nids avaient été observés.

Plage de nidification : Dhebaidhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 2003 : sept nids avaient été observés.

Plage de nidification : Feevah Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 2000 : sept nids avaient été observés.

Plage de nidification : Kuburudhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1999 : six nids avaient été observés.

Plage de nidification : Maalhoss Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1998 : huit nids avaient été observés.

Plage de nidification : Maavah Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : sept nids avaient été observés.

Plage de nidification : Maroshi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : sept nids avaient été observés.

Plage de nidification : Medhafushi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1996 : six nids avaient été observés.
Plage de nidification : Minimasgali Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1995 : six nids avaient été observés.

Plage de nidification : Muthaafushi Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les derniers relevés datent de 1998 : huit nids avaient été observés.

Plage de nidification : Vaikaramuraidhoo Island
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sontt pas disponibles. Les derniers relevés datent de 2000 : sept nids avaient été observés.
Contact de SWOT : Hussein Zahir
Martinique, département français d'outre-mer

Relevé 57
Source de données : (1) National Office of Wildlife and Hunting. Unpublished data from the 2006 La saison de nidification. **(2)** NGO SEPANMAR. *La saison de nidification 2006: Parts 1, 2, and 3*. Fort de France, Martinique: Ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Technical report. **(3)** NGO KAWAN, Marine Turtle Network of Martinique. 2008. Hawksbill nesting in Martinique. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Anse à Prunes (côte sud-est)
Année : 2006 **Nombre :** 2 nids, 5 activités de ponte
Longueur de la plage : 0,54 km

Plage de nidification : Anse à Voile (nord de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids confirmés, 4 montées
Longueur de la plage : 260 m

Plage de nidification : Anse Charpintiere (nord-est de la côte Atlantique)
Année : 2006 **Nombre :** 2 nids, 5 fausses montées
Longueur de la plage : 0,845 km

Plage de nidification : Anse Colas (milieu de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 2 montées
Longueur de la plage : 250 m

Plage de nidification : Anse Couleuvre (nord de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid confirmé, 9 montées
Longueur de la plage : 340 m

Plage de nidification : Anse Lévrier (nord de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 5 montées
Longueur de la plage : 200 m

Plage de nidification : Anse Meunier (côte sud-est)
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 1,5 km

Plage de nidification : Anse Trabaud (côte sud-est)
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 1,5 km

Plage de nidification : Dizac Diamant (côte sud)
Année : 2006 **Nombre :** 11 nids, 14 fausses montées, 12 montées
Longueur de la plage : 2,9 km

Plage de nidification : Grande Anse d'Arlet (sud de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 0,9 km

Plage de nidification : Grande Anse Loraine (nord-est côte Atlantique)
Année : 2006 **Nombre :** 9 nids, 1 fausse montée
Longueur de la plage : 1.65 km

Plage de nidification : Grande Anse Salines (côte sud-est)
Année : 2006 **Nombre :** 9 nids, 44 montées, 16 activités de nidification
Longueur de la plage : 1,23 km

Plage de nidification : Grande Terre (côte sud-est)
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids, 4 activités de nidification
Longueur de la plage : 0,59 km

Plage de nidification : Madiana (milieu de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 4 montées
Longueur de la plage : 200 m

Plage de nidification : Plage de la Française (milieu de la côte caribéenne)
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 150 m

Plage de nidification : Rade de Sainte Marie (nord-est de la côte Atlantique)
Année : 2006 **Nombre :** 2 nids
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : Les plages citées ci-dessus de la Martinique ont été suivies à des degrés divers, allant de patrouilles de jour ou de nuit à des patrouilles semi-hebdomadaires, ou encore des observations uniques durant différentes époques de la saison de nidification. La saison de ponte sur toutes les plages court de mai à septembre, avec un pic en juin.
Contact de SWOT : Claire Cayol

MAYOTTE, COLLECTIVITÉ FRANÇAISE D'OUTRE-MER

Relevé 58
Source de données : Bourjea, J., and S. Ciccione. Hawksbill nesting in French Overseas Territories: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de Mayotte
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Une trentaine de nids est estimé chaque année sur l'île de Mayotte.
Contacts de SWOT : Jérome Bourjea et Stephane Ciccione

MEXIQUE

Relevé 59
Source de données : Cuevas, E., Canul-Rosado, D., Tzeek-Tuz, M., Muñoz-Terán, K., and F. Loyo-Buenfil. 2006. *Reporte Final de Actividades de Conservación en las Playas de Anidación de Celestún y El Cuyo en Yucatán e Isla Holbox en Quintana Roo, México*. Mérida, Yucatán, Mexico: Pronatura Península de Yucatán. Rapport non publié.
Plage de nidification : Celestún, Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán
Année : 2006 **Nombre :** 348 nids
Longueur de la plage : 24 km

© AVEC L'AIMABLE AUTORISATION D'EDITH ET RICHARD VAN DER WAL

Noms: Edith et Richard van der Wal
Projet: Fondation Turtugaruba
Lieu: Aruba

La fondation Turtugaruba protège les nids de tortues luths, caouannes, vertes et imbriquées des menaces liées au développement du littoral à Aruba : lumières artificielles, véhicules sur la plage, pollution et dégradation de l'habitat. La permanence téléphonique de Turtugaruba, opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a permis de sensibiliser les citoyens d'Aruba et les touristes à la conservation des tortues marines.

Plage de nidification : El Cuyo, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán
Année : 2006 **Nombre :** 286 nids
Longueur de la plage : 31 km

Plage de nidification : Isla Holbox, Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo
Année : 2006 **Nombre :** 602 nids
Longueur de la plage : 24 km
Effort de suivi : des patrouilles de nuit sur toute la plage ont été effectuées du 1er avril au 31 août 2006, sur les trois plages citées ci-dessus. La saison de ponte court d'avril à août, avec un pic en juin.
Contact de SWOT : Eduardo Cuevas

Relevé 60

Source de données : CONANP, et Comité Estatal para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas del Estado de Campeche. 2008. Hawksbill nesting in Campeche, Mexico. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Chacahito, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 35 nids
Longueur de la plage : 8,1 km

Plage de nidification : Ensenada, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 55 nids
Longueur de la plage : 6 km

Plage de nidification : Isla Arena, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 35 nids
Longueur de la plage : 8 km

Plage de nidification : San Lorenzo, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 23 nids
Longueur de la plage : 1,8 km

Plage de nidification : Victoria, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 40 nids
Longueur de la plage : 22,73 km
Effort de suivi : des patrouilles quotidiennes ont été effectuées du 1er avril au 30 septembre 2006 sur chacune des cinq plages citées ci-dessus. La saison de ponte court d'avril à septembre, avec un pic en juin.

Plage de nidification : Chenkan, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 279 nids
Longueur de la plage : 20 km

Plage de nidification : Isla Aguada, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 236 nids
Longueur de la plage : 27,75 km

Plage de nidification : Isla del Carmen, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 245 nids
Longueur de la plage : 35 km

Plage de nidification : Punta Xen, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 520 nids
Longueur de la plage : 30 km

Plage de nidification : Sabancuy, Campeche
Année : 2006 **Nombre :** 227 nids
Longueur de la plage : 24,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées du 1er avril au 30 octobre 2006 sur chacune des cinq plages citées ci-dessus. La saison de ponte court d'avril à octobre, avec un pic en Juin.
Contact de SWOT : Vicente Guzman H.

MOZAMBIQUE

Relevé 61

Source de données : Costa, A. 2007. *Report of Marine Turtle Conservation in Quirimbas National Park, Cabo Delgado*. Maputo, Mozambique: Marine Programme, WWF Mozambique.
Plages de nidification : Plage de Lemani et plage de Paquissico Tchawane, Parc national de Quirimbas, Cabo Delgado
Longueur de la plage : 5 km
Commentaires : Les données de ponte pour la saison 2005–06 ne sont pas disponibles. En 2006–07, 104 nouveaux-nés de tortues imbriquées ont été observés lors de patrouilles le matin et le soir du 1er octobre 2006 au 6 juin 2007.
Contact de SWOT : Alice Costa

Relevé 62

Source de données : Garnier, J., and I. Silva. 2008. Hawksbill nesting in Mozambique. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : île de Rongui et île de Vamizi
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 12 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour ont été effectuées sur les deux îles toute l'année, plus des patrouilles de nuit lors de la saison de ponte de novembre à mars.
Contacts de SWOT : Julie Garnier et Isabel Silva

ANTILLES NÉERLANDAISE BONAIRE

Relevé 63

Source de données : Nava, M. 2006. Sea Turtle Conservation Bonaire: Progress Report 2006. Rapport non publié.
Plage de nidification : Plage sans nom, Bonaire
Année : 2006 **Nombre :** 42 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Playa Pali Mangel
Année : 2006 **Nombre :** 7 nids
Longueur de la plage : 0.7 km
Effort de suivi : Sur chacune de ces plages, la plage a été entièrement patrouillée un matin sur deux du 15 mai à décembre 2006. Le pic de ponte est en août et en septembre.

Plage de nidification : Playa Washikemba
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 400 m
Effort de suivi : La plage a été entièrement patrouillée un matin sur deux du 15 mai à décembre 2006. Le pic de ponte est en octobre.
Contact de SWOT : Mabel Nava

ST. EUSTATIUS

Relevé 64

Source de données : Harrison, E., and A. Herrera. 2006. *St. Eustatius Sea Turtle Conservation Programme Annual Report 2006*. Rapport non publié.
Plage de nidification : Kay Bay, Oranje Bay, et plage de Zeelandia, St. Eustatius
Année : 2006 **Nombre :** 6 nids, 2 fausses montées, 1 femelle nidificatrice
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour et de nuit sur toute la plage ont été effectuées du 17 mars au 6 octobre 2006. Le pic de ponte est en juillet.
Contact de SWOT : Arturo Herrera

ST. MAARTEN

Relevé 65

Source de données : Nisbeth, B. M., Nature Foundation. 2008. Hawksbill nesting in Gibbs Bay, St. Maarten. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Gibbs Bay
Année : 2006 **Nombre :** 1 montée
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée deux fois par semaine du 1er avril au 1er novembre 2006. La saison de ponte court d'avril à novembre, avec un pic de juillet à octobre.
Contact de SWOT : Beverly Mae Nisbeth

Relevé 66

Source de données : Vissenberg, D., Nature Foundation. 2008. Hawksbill nesting in Guana Bay, St. Maarten. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Guana Bay
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids
Longueur de la plage : 1 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée trois à quatre soirs par semaine d'avril à octobre 2006. La saison de ponte court d'avril à fin octobre, avec un pic de mai à octobre.
Contact de SWOT : Dominique Vissenberg

NICARAGUA

Relevé 67

Source de données : Urtreaga, J. 2008. Hawksbill nesting in Nicaragua: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : La Flor
Année : 2006 **Nombre :** 10–20 nids estimés
Commentaires : L'activité de ponte des tortues imbriquées est sporadique sur la côte Pacifique du Nicaragua, avec 10–20 nids relevés par an autour de La Flor.
Contact de SWOT : José Urteaga

Relevé 68

Source de données : Campbell, C. L., Lagueux, C. J., and V. Huertas. 2007. *2006 Pearl Cays Hawksbill Conservation Project, Nicaragua*. Wildlife Conservation Society Final Report.
Plage de nidification : Pearl Cays
Année : 2006 **Nombre :** 200 nids (minimum)
Longueur de la plage : 3,3 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées de juin à octobre 2006. Pendant le reste de la saison de ponte, les plages ont été patrouillées une fois par semaine ou toutes les deux semaines. La saison de ponte court de mai à novembre, avec un pic de juillet à septembre.
Contacts de SWOT : Cathi Campbell et Cynthia Lagueux

OMAN

Relevé 69

Source de données : Rees, A. 2008. Hawksbill nesting in Oman. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Plages 1–3 de Ros Shiban
Année : 2006 **Nombre :** 14 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Plages 3–5 de Ros Shiban
Année : 2006 **Nombre :** 27 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Plages 5–7 de Ros Shiban
Année : 2006 **Nombre :** 50 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Plages 7–9 de Ros Shiban
Année : 2006 **Nombre :** 70 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Plages du sud-est
Année : 2006 **Nombre :** 188 nids
Longueur de la plage : 2 km

Plage de nidification : Plages du sud-ouest N
Année : 2006 **Nombre :** 11 nids
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification : Plages du sud-ouest Omedu
Année : 2006 **Nombre :** 66 nids
Longueur de la plage : 1 km

Plage de nidification : Plages du sud-ouest S
Année : 2006 **Nombre :** 36 nids
Longueur de la plage : 1 km
Contact de SWOT : Alan Rees

PALAOS

Relevé 70

Source de données : Klain, S., and J. Eberdong. 2007. *Palau Marine Turtle Conservation and Monitoring Program, 2005–2006: Report to National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*. Rapport non publié.
Plages de nidification : Ngerbelas, Ngeruangel et Orak, État de Kayangel
Année : 2006 **Nombre :** 2, 3 et 5 nids, respectivement
Longueur de la plage : 410, 200 et 100 m, respectivement

© AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE SARAH KLAIN

Nom: Joshua Eberdong et Sarah Klain
Projet: Marine Turtle Conservation and Monitoring Program (MTCMP)
Lieu: Palaos

Le MTCMP au Bureau des ressources marines de Palaos est un effort collaboratif entre l'État de Palaos et les gouvernements nationaux. Les responsables de la conservation de l'État interviennent sur les plages de ponte des principales îles de Palaos et sur les îles isolées de Merir et Helen. Notre travail comprend le suivi de la plage de ponte, la recherche et le baguage et un programme d'observation de la pêche. L'un des principaux succès du projet a été la documentation sur les migrations internationales.

Effort de suivi : Chacune de ces plages a été suivie une fois par mois durant la saison de ponte.

Plages de nidification : Breu Rock Island, Kmekumer, Moir, Neco Beach/Ngeanges, Ngeremdiu, Ngerukeuid, Ngerureomel, Omekang, Ongtekatl, Ouiars, Such et Ulong, État de Koror
Année : 2006 **Nombre :** 3, 13, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 et 7 nids, respectivement
Longueur de la plage : 70, 60, 150, 400, 650, 750, 300, 150, 175, 125, 25 et 200 m, respectivement
Effort de suivi : Chacune de ces plages a été suivie une fois par mois durant la saison de ponte.

Plages de nidification : East Beach/Lisel a Lekeok, Euidelchol, Loulomekang, Kisaks et Kltaliis, État de Koror
Année : 2006 **Nombre :** 1, 1, 1, 4 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 0,1, 1,5, 0,7, 0,3 et 0,02 km, respectivement
Effort de suivi : Chacun de ces relevés a été effectué lors d'une observation unique.

Plage de nidification : East Beach, État de Melekeok
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 3,5 km

Plages de nidification : Chol, Ngesar/Kwabs et Ngkeklau, État de Ngaraard
Année : 2006 **Nombre :** 5, 1 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 2,75, 0,4, et 0,3 km, respectivement

Plages de nidification : Ngerchur et Ngerkeklau, État de Ngarchelong
Année : 2006 **Nombre :** 5 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 0,9 et 0,6 km, respectivement

Plages de nidification : Plage Honeymoon et Mesubedu-mail, État de Peleliu
Année : 2006 **Nombre :** 4 et 2 nids, respectivement
Longueur de la plage : 1 km chacune
Effort de suivi : Chacune des plages citées ci-dessus dans les États de Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong et Peleliu a été suivie une fois par mois lors de la saison de ponte, à l'exception de Ngerchur dans l'État de Ngarchelong visitée une seule fois.
Commentaires : La saison de ponte sur toutes les plages de Palaos court de mai à août.
Contacts de SWOT : Joshua Eberdong et Sarah Klain

PANAMA

Relevé 71

Source de données : Patiño-Martínez, J., and L. Quiñones. 2008. Hawksbill nesting in Panama: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Anatxukuna et Armila, Kuna Yala
Longueur de la plage : 0,88 et 4,5 km, respectivement
Commentaires : Chacune de ces plages accueillent une activité de ponte indéterminée de tortues imbriquées à partir de mai jusqu'à une date non spécifiée. Ces informations ont été rassemblées suite à des observations personnelles lors de comptages de traces et d'entretiens avec la population locale.
Contact de SWOT : Juan Patiño-Martínez

Relevé 72

Source de données : Ordoñez, C., et al. 2007. R*eport on Monitoring and Research Activities, Chiriqui Beach, Panama*. Rapport non publié.
Plages de nidification : Plage de Chiriqui, province de Bocas del Toro
Année : 2006 **Nombre :** 537 nids
Longueur de la plage : 24 km
Effort de suivi : La plage dans son ensemble a fait l'objet d'un inventaire des traces en janvier et en décembre 2006 et trois à quatre fois par semaine en février et en novembre. Quinze kilomètres ont été patrouillés de nuit du 1er mas au 31 octobre 2006. La saison de ponte court de mars à novembre, avec un pic de juin à août.
Contacts de SWOT : Emma Harrison et Cristina Ordoñez

Relevé 73

Source de données : Meylan, P., and A. Meylan. 2007. *Ecología y Migración de las Tortugas Marinas en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá*. Rapport non publié à Autoridad Nacional del Ambiente.
Plage de nidification : Playa Larga, province de Bocas del Toro
Année : 2006 **Nombre :** 34 nids
Longueur de la plage : 3 km
Commentaires : Des patrouilles quotidiennes sur toute la plage ont été effectuées du 25 mars au 21 octobre 2006. La saison de ponte court d'avril à octobre, avec un pic en juillet et en août.

Plage de nidification : Zapatilla Cays, province de Bocas del Toro
Année : 2006 **Nombre :** 172 nids
Longueur de la plage : 4,2 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes sur toute la plage ont été effectuées du 1er mai au 30 novembre 2006. La saison de ponte court d'avril à octobre, avec un pic en juillet et en août.
Contact de SWOT : Anne Meylan

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Relevé 74

Source de données : Krueger, B. 2008. Hawksbill nesting in Papua New Guinea: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plages de nidification : Kudube Island, Takala Island et Utube Island
Longueur de la plage : 525 m au total
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Lors de la saison de ponte 2007, 116 nids de tortues imbriquées ont été relevés. La saison de ponte court d'octobre à mars.
Contact de SWOT : Barry Krueger

PHILIPPINES

Relevé 75

Source de données : (1) Torres, D., Santa Cruz, E., Mansanero, L. I., and G. A. Santa Cruz. 2004. *Conservation of a Remnant Hawksbill Nesting Habitat in Punta Dumalag, Brangay Matina Aplaya, Davao City, Philippines*. **(2)** Cruz, R. 2008. Hawksbill nesting in the Philippines: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Apo Reef Island, Sablayan, province de Mindoro Occidental
Année : 2006 **Nombre :** 4 femelles nidificatrices
Commentaires : Des patrouilles de nuit ont été effectuées sur cette île de 22 hectares lorsque les conditions climatiques le permettaient. Selon les premiers résultats, la saison de ponte court de mai à septembre.

Plages de nidification : Bagac et Morong, province de Bataan
Longueur de la plage : Environ 7 km
Commentaires : Selon un suivi de nuit lors de la saison de ponte des tortues olivâtres (août à mars), il y a environ un à deux nids de tortues imbriquées par an sur ces plages.

Plages de nidification : Botolan, Iba et San Antonio, province de Zambales
Longueur de la plage : 48,6 km
Commentaires : Un suivi en cours permet d'estimer que le nombre de femelles en ponte est de un à trois par an sur ces plages.

Plages de nidification : Davao City, Matina, Punta Damalag et Samal Island, golfe de Davao
Année : 2006 **Nombre :** >3 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 1,04 km

Plage de nidification : Panikian Island, Pitogo, province de Zamboanga del Sur
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles dataient de 2000 : trois femelles en ponte avaient été relevées.
Contact de SWOT : Renato Cruz et Romeo Trono

PORTO RICO

Relevé 76

Source de données : L. Montero, 2006. P*royecto de Conservación de Tortugas Marinas Humacao, Yabucoa y Maunabo, Puerto Rico, Temporada 2006*. DNER-PR, Rapport non publié.
Plage de nidification : Caja-de-Muertos
Année : 2006 **Nombre :** 64 nids
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées le matin sur la moitié de la plage du 1er janvier au 30 décembre 2006. La saison de ponte court de janvier à décembre, avec un pic en septembre et en octobre.

Plage de nidification : Culebra
Année : 2006 **Nombre :** 51 nids
Longueur de la plage : 6 km

Plage de nidification : Humacao
Année : 2006 **Nombre :** 94 nids
Longueur de la plage : 9 km

Plages de nidification : Plages d'El Faro, Mario, Los Bohios et California, Maunabo
Année : 2006 **Nombre :** 31 nids
Longueur de la plage : 5,15 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées le matin sur toute la plage, sur chacune des trois plages citées ci-dessus, du 12 juillet au 15 décembre 2006. La saison de ponte court de juillet à décembre, avec un pic en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : Carlos Diez et Robert van Dam

Relevé 77

Source de données : Diez, C. E., and R. P. van Dam. 2007. *Mona and Monito Island, Puerto Rico, Hawksbill Turtle Research Project, Research Report for 2006*. Rapport non publié.
Plage de nidification : Mona Island
Année : 2006 **Nombre :** 951 nids
Longueur de la plage : 7,1 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées le matin sur toute la plage du 8 août au 5 décembre 2006. Le pic de ponte est en septembre et en octobre.
Contacts de SWOT : Carlos Diez et Robert van Dam

QATAR

Relevé 78

Source de données : Pilcher, N. J., Marine Research Foundation. 2005. *Final Report: Status of Sea Turtles in Qatar*. Qatar: Supreme Council for the Environment and Natural Reserves.
Plage de nidification : Plage de Fuwairit
Commentaires : Les données de nidification de 2006 n'étaient pas disponibles. Lors d'un inventaire du 15 avril au 31 juillet 2005, 27 femelles nidificatrices et 67 cas de nidification avaient été relevés.
Contact de SWOT : Nicolas Pilcher

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

Relevé 79

Source de données : St. Kitts Sea Turtle Monitoring Network, Ross University School of Veterinary Medicine. 2008. Hawksbill nesting in St. Kitts. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Cayon to Keys, Saint-Christophe
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid estimé
Longueur de la plage : 4 km
Plage de nidification : Conaree, Saint-Christophe
Année : 2006 **Nombre :** 6 nids estimés
Longueur de la plage : 3 km

Plage de nidification : Majors Bay, Saint-Christophe
Année : 2006 **Nombre :** 22 nids estimés
Longueur de la plage : 0,6 km
Effort de suivi : Les trois plages citées ci-dessus ont fait l'objet d'un inventaire lors de patrouilles matinales hebdomadaires du 1er juillet au 30 septembre 2006. La saison de ponte court de juillet à février.
Contact de SWOT : Kimberly Stewart

Relevé 80

Source de données : Pemberton, E., Nevis Department of Fisheries. 2008. Hawksbill nesting in Nevis. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Lover's Beach, Nevis
Année : 2006 **Nombre :** 86 nids
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : Des patrouilles de nuit ont été effectuées trois à cinq nuits par semaine ainsi que des patrouilles matinales lorsqu'il n'y a pas eu de patrouille de nuit, du 1er avril au 10 décembre 2006. La saison de ponte court de mars à début décembre, avec un pic de juillet à septembre.
Contact de SWOT : Emile Pemberton

SAINTE LUCIE

Relevé 81

Source de données : Durrell Wildlife Conservation Trust and St. Lucia Forestry Department (Ministry of Agriculture). 2008. Hawksbill nesting in St. Lucia. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Plage de Grande Anse
Année : 2006 **Nombre :** 2 montées
Longueur de la plage : 1,26 km

Plage de nidification : Plage de Louvet
Année : 2006 **Nombre :** 4 nids
Longueur de la plage : 406 m
Effort de suivi : Des inventaires hebdomadaires ont été effectués du 23 février au 10 août 2006 sur chacune de ces plages. La saison de ponte court de mars à novembre, avec un pic d'avril à juin.
Contact de SWOT : Matthew Morton

SAMOA

Relevé 82

Source de données : Momoemausu, M., Ward, J., Iakopo, M., Ifopo, P., and F. Sio. 2006. *Report on the Hawksbill Turtle Nesting Survey 2005–2006*. Samoa: Division of Environment and Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment. Rapport non publié.
Plages de nidification : Plages de Namua et Nuulua sur l'île d'Upolu et plages de Nuutele et Vini sur l'île de Nuutele
Année : 2006 **Nombre :** 27 nids
Longueur de la plage : 430, 680, 160, et 420 m, respectivement
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées chaque nuit pendant une semaine lors du pic de la saison de ponte en janvier et février. Lors des basses saisons (octobre à juin), les visites se sont effectuées toutes les deux semaines.
Contacts de SWOT : Malama Momoemausu et Juiny Ward

SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE

Relevé 83

Source de données : MARAPA ONG and PROTOMAC. *Rapport des Activités*. São Tomé and Príncipe, Central Africa. Rapport non publié.
Plages de nidification : Plages de Príncipe
Année : 2006 **Nombre :** 36 nids

Plages de nidification : Plages de São Tomé
Année : 2006 **Nombre :** 38 nids
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes de toutes les plages ont été effectuées du 3 octobre 2005 au 30 avril 2006. La saison de ponte court de septembre à avril.
Contacts de SWOT : Alain Gibudi et Elisio Neto

ARABIE SAOUDITE

Relevé 84

Source de données : Pilcher, N. J. 1999. The hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata*, in the Arabian Gulf. *Chelonian Conservation and Biology*, vol. 3, no. 2 (1999).
Plage de nidification : île de Jana
Longueur de la plage : 1,6 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 1992 : 120 femelles en ponte avaient été baguées sur l'île de Jana lors d'une étude effectuée du 3 au 24 juin.

Plage de nidification : île de Jurayd
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 1991 : 10 femelles en ponte avaient été baguées du 27 mai au 18 juin.

Plage de nidification : île de Karan
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 1992 : sept femelles en ponte avaient été baguées lors d'inventaires réalisés entre le 5 et le 30 juillet. L'étude a été effectuée lors du pic de la saison de ponte des tortues vertes et non lors du pic de la saison de ponte des tortues imbriquées.
Plage de nidification : île de Kurayn
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles datent de 1991 : selon les estimations, 34 tentatives de nidification ont été relevées sur l'île de Kurayn.
Contact de SWOT : Nicolas Pilcher

SÉNÉGAL

Relevé 85

Source de données : Fretey, J. 2001. *Biogeography and Conservation of Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa*. CMS Technical Series, Publication No. 6. Bonn, Germany: United National Environment Program / Convention on Migratory Species Secretariat.
Plages de nidification : Plages près de Guéréo et dans le delta de Saloum a
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les tortues imbriquées pondent apparemment en faible densité dans ces régions du Sénégal.
Contact de SWOT : Jacques Fretey

SEYCHELLES

Relevé 86

Source de données : Seychelles Islands Foundation (SIF). 2008. Hawksbill nesting in Aldabra Atoll, Seychelles. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : atoll d'Aldabra
Année : 2006 **Nombre :** 20–50 nids estimés
Commentaires : Une activité de ponte clairsemée a lieu sur l'atoll d'Aldabra, la plupart des nids se trouvant dans la partie lagunaire d'Aldabra. Les estimations sont basées sur le comptage des traces effectué par les rangers de Seychelles Islands Foundation (SIF) depuis 1981.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 87

Source de données : Nature Protection Trust of Seychelles. 2007. *2006–2007 Silhouette Conservation Project: Quarterly Report*. Rapport non publié.

Plage de nidification : Anse Lascars, île de Silhouette
Longueur de la plage : 440 m
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. En 2006–2007, deux nids ont été trouvés lors de patrouilles non régulières. La saison de ponte court de septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : Anse Patates, île de Silhouette
Longueur de la plage : 180 m
Commentaires : Les données de ponte de 2006 n'étaient pas disponibles. La ponte de tortues imbriquées est connue sur ce site.

Plage de nidification : Baie Cipailles, île de Silhouette
Longueur de la plage : 0,51 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. En 2006–2007, cinq nids ont été trouvés lors de patrouilles non régulières. La saison de ponte court de septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : Grande Barbe, île de Silhouette
Longueur de la plage : 1,45 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. En 2006-2007, 250 nids ont été observés et globalement, le nombre de nids estimé était de 360. La saison de ponte court de septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : La Passe, île de Silhouette
Longueur de la plage : 1,77 km
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. In 2006-2007, cinq nids ont été trouvés lors de patrouilles non régulières. La saison de ponte court de septembre à avril, avec un pic en décembre et en janvier.

Plage de nidification : Pointe Etienne, île de Silhouette
Année : 2006 **Nombre :** 13 nids
Longueur de la plage : 370 m
Effort de suivi : Les données proviennent d'une observation unique le 8 décembre 2006.
Contact de SWOT : Justin Gerlach

Relevé 88

Source de données : (1) Island Conservation Society of Seychelles. 2008. Hawksbill nesting in Aride Island Nature Reserve, Seychelles. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008). **(2)** Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP)*: Turtle Component. Final report, vol. 1 and vol. 2.
Plage de nidification : Réserve de nature d'Aride Island
Année : 2006 **Nombre :** 50–60 nids estimés
Commentaires : les estimations de l'activité de ponte sont basées sur des comptages quotidiens de traces par le personnel d'Island Conservation Society of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 89

Source de données : Mortimer, J., and Bird Island Lodge. 2008. Hawksbill nesting on Bird Island, Seychelles: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : Bird Island
Année : 2006 **Nombre :** 125–200 nids estimés
Commentaires : les estimations de l'activité de ponte sont basées sur des comptages de trace et des données de baguage collectées par le personnel de Bird Island Lodge.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 90

Source de données : Nature Seychelles. 2008. Hawksbill nesting on Cousin Island, Seychelles. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).

Plage de nidification : Réserve spéciale de Cousin Island
Année : 2006 **Nombre :** 331 nids, 91 femelles baguées, 419 cas de nidification
Longueur de la plage : 1,73 km
Effort de suivi : La plage a été patrouillée au moins une fois par jour d'août 2005 au 15 mars 2006. La saison de ponte court de septembre à mi-mars, avec un pic de novembre à janvier.
Contact de SWOT : Naomi Doak

Relevé 91

Source de données : Jolliffe, K., and S.-M. Jolliffe. 2008. Hawksbill nesting on Cousine Island, Seychelles: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Cousine Island, îles granitiques
Année : 2006 **Nombre :** 66 nids, 47 fausses montées, 36 femelles nidificatrices
Longueur de la plage : 0,9 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour et toutes les heures on été effectuées du 20 août 2005 au 5 mars 2006. La saison de ponte court de septembre à mars, avec un pic de novembre à janvier.
Contacts de SWOT : Kevin et San-Marie Jolliffe

Relevé 92

Source de données : (1) Marine Parks Authority of Seychelles. 2008. Hawksbill nesting in Curieuse Island Marine Park, Seychelles. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008). **(2)** Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle Component*. Final report, vol. 1 and vol. 2. **(3)** Rulie, A. C. 2002. Reflexion sur la conservation de la tortue imbriquee (*Eretmochelys imbricata*): Application aux Seychelles. *Ecole Nationale Veterinaire Toulouse. Annee 2002 These*: 2002-TOU3-4166.
Plages de nidification : Huit plages dans le parc marin de l'île de Curieuse
Année : 2006 **Nombre :** 200–250 nids estimés
Commentaires : Les estimations de l'activité de ponte sont basées sur le comptage de traces effectué par Anne-Claire Rulie et les rangers du Marine Park Authority of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 93

Source de données : Mortimer, J. A. 2005. Sea Turtles of D'Arros Island and St. Joseph Atoll: Status and Recommendations. In U. Engelhardt, ed. 2005. *Proceedings of a Scientific Symposium held at the D'Arros Research Centre 15–17 Avril 2005*. Seychelles: D'Arros Research Centre. Technical Report No. 1.
Plages de nidification : île D'Arros et atoll de St. Joseph
Année : 2006 **Nombre :** 250–300 femelles en ponte selon les estimations
Commentaires : Les estimations de l'activité de ponte sont basées sur le comptage de traces effectué par le personnel de D'Arros Development (Pty) Ltd. et D'Arros Research Centre. Selon les estimations, plus de 1.000 nids sont dénombrés sur cette île par an.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 94

Source de données : Bovenberg, M., and R. Vonk. 2007. *The Hawksbill Turtle (*Eretmochelys imbricata*) on Fregate Island: The Hawksbill Turtle's Nesting Population and Nesting Habitat on Fregate During the North-West Monsoon in 2006–07*. Rapport non publié.
Plage de nidification : île de Fregate
Commentaires : Les données de ponte de la saison 2005–06 ne sont pas disponibles. Lors de la saison de ponte 2006–07, environ 150 nids ont été creusés sur l'île de Fregate, correspondant approximativement à 50 femelles individuelles.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 95

Source de données : Vanherck, L. 2008. Hawksbill nesting on North Island, Seychelles: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : North Island
Année : 2006 **Nombre :** 30–50 nids estimés
Commentaires : Environ 30 à 50 nids ont été creusés chaque année lors des saisons de ponte 2005–06 et 2006–07 sur North Island. La saison de ponte court de septembre à janvier.
Contact de SWOT : Linda Vanherck

Relevé 96

Source de données : Mortimer, J. A. 2004. *Seychelles Marine Ecosystem Management Project (SEYMEMP): Turtle Component*. Final report, vol. 1 and vol. 2.
Plages de nidification : Cinq plages du parc marin de Ste. Anne

Année : 2006 **Nombre :** 200–250 nids estimés
Commentaires : les estimations de ponte sont basées sur les comptages de traces effectués par les rangers du Marine Park Authority of Seychelles.
Contact de SWOT : Jeanne A. Mortimer

Relevé 97

Source de données : Talma, E. 2006. *Interim report on 2005–06 Turtle La saison de nidification in the South of Mahe, Seychelles*. Marine Conservation Society Seychelles. Technical report.
Plages de nidification : Plages du sud de l'île de Mahe
Année : 2006 **Nombre :** 242 nids
Longueur de la plage : 1,83 km
Effort de suivi : Des patrouilles de jour ont été effectuées trois fois par semaine entre septembre 2005 et mars 2006, et une fois toutes les deux semaines le reste de l'année. La saison de ponte court d'octobre à février, avec un pic en novembre et en décembre.
Commentaires : Les données sont combinées pour cinq plages adjacentes.
Contact de SWOT : Elke Talma

Source de données : Mortimer, J. A. 2008. Hawksbill nesting in the Seychelles: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Commentaires : Les Seychelles comprennent plus de 120 îles et plusieurs centaines de plages. La plupart des plages accueillent des tortues imbriquées en ponte chaque année. Les rapports ci-dessus présentent des données collectées sur des sites parmi les mieux protégés et les mieux étudiés du pays, mais ne sont en aucun cas exhaustifs.

ÎLES SALOMON

Relevé 98

Source de données : Siota, C., and P. Ramohia. 2007. *Peak Hawksbill Nesting Activities in the Arnavon Community Marine Conservation Area: A Report for The Nature Conservancy, Solomon Islands Field Office, Honiara*. Manuscript non publié.
Plage de nidification : Zone de conservation à gestion communautaire d'Arnavon, Santa Isabel
Année : 2006 **Nombre :** 286 nids
Longueur de la plage : environ 4,5 km
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées de jour et de nuit du 1er juin au 31 août 2006.
Contacts de SWOT : Peter Ramohia et Catherine Siota

Relevé 99

Source de données : Ramohia, P., Siota, C., Motui, D., Routanis, F., Pema, M., Rini, C., Zama, M., Tetabea, T., Madada, L., and G. Willy. 2007. *Hawksbill and Green Turtle Nesting Activities on Kerehikapa Island in the Arnavon Community Managed Conservation Area: A Report for The Nature Conservancy, Solomon Islands Field Office*. Manuscript non publié.
Plage de nidification : île de Kerehikapa, Santa Isabel
Année : 2006 **Nombre :** 345 nids
Longueur de la plage : 1,2 km
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées de jour et de nuit du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Contacts de SWOT : Peter Ramohia et Catherine Siota

SRI LANKA

Relevé 100

Source de données : (1) Ekanayake, E. M. L., Ranawana, K. B., Kapurusinghe, T., Premakumara, M. G. C., and M. M. Saman. 2002. Marine turtle conservation in Rekawa turtle rookery in southern Sri Lanka. *Ceylon Journal of Science (Biological Science)* 30: 79–88. **(2)** The Turtle Conservation Project. Turtle Nesting Beaches in Sri Lanka. http://www.tcpsrilanka.org/download/Map.pdf
Plages de nidification : Côte sud du Sri Lanka
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Il est connu que les tortues imbriquées pondent sur les plages du sud du Sri Lanka.

SURINAME

Relevé 101

Source de données : (1) Mitro, S. A paraitre. Country report of Suriname. In *Proceedings of the Seventh Sea Turtle Symposium for the Guianas (Octobre 25–27, 2004)*. Georgetown, Guyana. **(2)** Hilterman, M. L., Goverse, E., Tordoir, M. T., and H. A. Reichart. A paraitre. Beaches come and beaches go: Coastal dynamics in Suriname are affecting important sea turtle rookeries. In *Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation: NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC*. **(3)** De Dijn, B. 2003. Country report of Suriname: Marine turtle season 2002. In *Proceedings of the Sixth Sea Turtle Symposium for the Guianas*, compilers I. Nolibos, L. Kelle, B. De Thoisy, and S. Lochon, 8–10. Remire–Montjoly, French Guiana.
Plage de nidification : Plage de Matapica (ex- Bigisanti)
Commentaires : Les données de nidification de 2006 ne sont pas disponibles. Sur la base de trois décennies de suivi des nids au Suriname, il est avéré que la plage de Matapica (autrefois appelé Bigisanti) accueille 99 pour cent de tous les nids de tortues imbriquées du pays. Les dernières données disponibles datent de 2002 et de 2003 : 21 et 16 nids ont été relevés, respectivement.
Contacts de SWOT : Edo Goverse et Maartje Hilterman

TANZANIE

Relevé 102

Source de données : Muir, C. 2008. Hawksbill nesting in Tanzania: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Kilindoni, île de Mafia
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 2,5 km
Commentaires : La ponte de tortues imbriquées est rare en Tanzanie.
Contact de SWOT : Catharine Muir

THAÏLANDE

Relevé 103

Source de données : Charuchinda, M., and S. Monanunsap. 1998. Monitoring survey on sea turtle nesting in the Inner Gulf of Thailand, 1994–1996. *Thailand Marine Fisheries Research Bulletin* 6:17–25.
Plage de nidification : île de Khram, province de Chonburi
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Les dernières données disponibles dataient de 1996 : 42 nids de tortues imbriquées avaient été relevés par des patrouilles de nuit lors de la saison de ponte (mai à août). De 1973 à 1996, environ 74 nids de tortues imbriquées avaient été observés sur ce site. Une activité de ponte sporadique de tortues imbriquées a également été notée sur d'autres îles du golfe de Thaïlande, notamment les îles de Man, Lan, Chang, Samet et Thalu.

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Relevé 104

Source de données : Livingstone, S. R. 2006. *Sea Turtle Ecology and Conservation on the North Coast of Trinidad*. PhD diss., University of Glasgow, Scotland.
Plages de nidification : 5 petites baies sableuses autour de Grande Riviere (côte nord), Trinité
Longueur de la plage : 50 km
Commentaires : Environ 675 nids de tortues imbriquées sont creusés chaque année sur ces plages dans leur ensemble. L'estimation est basée sur des données collectées d'avril à septembre de 2000 à 2004 lors de patrouilles sur toute la côte deux à trois soirs, tous les une à deux semaines. La saison de ponte court de mai à septembre avec un pic en juillet et en août.
Contact de SWOT : Suzanne Livingstone

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Relevé 105

Source de données : (1) Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Fish and Wildlife Research Institute, Statewide Nesting Beach Survey Program. http://research.myfwc.com. **(2)** Brost, B. 2008. Hawksbill nesting in Florida, USA: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008).
Plage de nidification : Bahia Honda State Park, Monroe County, Floride
Année : 2006 **Nombre :** 3 nids
Longueur de la plage : 4,7 km
Effort de suivi : Des patrouilles quotidiennes ont été effectuées du 17 avril au 1er septembre 2006. La nidification a lieu entre début août et mi-octobre.

Plages de nidification : Plages de Boca Raton, Palm Beach County, Floride
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 8 km
Plage de nidification : Plage de Breakers, Palm Beach County, Florida
Année : 2006 **Nombre :** 1 nid
Longueur de la plage : 0,5 km
Effort de suivi : Les plages ci-dessus de Palm Beach County ont été patrouillées chaque matin du 1er mars au 31 octobre 2006.
Contact de SWOT : Beth Brost

Relevé 106

Source de données : Pacific Whale Foundation. *Sea Turtles: A Hawai'i Wildlife Guide*. http://www.pacificwhale.org.
Plages de nidification : Plages sur l'île d'Hawai'i (Big Island), Mau'i, Moloka'i et O'ahu, Hawaï
Commentaires : Environ 10–15 nids de tortues imbriquées sont creusés chaque année dans l'État d'Hawaï. Les pontes ont lieu à 90 pour cent sur la côte de Ka'u sur l'île d'Hawai'i. La saison de ponte court de mi-mai à novembre.
Contact de SWOT : George Balazs

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS U.

Relevé 107

Source de données : *NPS Buck Island Reef National Monument Sea Turtle Research Program Seasonal Report 2006*. St. Croix, U.S. Virgin Islands: National Park Service, Buck Island Reef National Monument, Division of Resource Management. Rapport non publié.
Plages de nidification : Buck Island Reef National Monument, St. Croix
Année : 2006 **Nombre :** 133 nids confirmés, 101 nids potentiels
Longueur de la plage : 1,5 km
Effort de suivi : Ces plages ont été patrouillées du 1er juillet au 30 septembre 2006. La ponte a lieu toute l'année, avec un pic de juillet à octobre.
Contact de SWOT : Zandy Hillis-Starr et Ian Lundgren

VENEZUELA

Relevé 108

Source de données : (1) Guada, H. 2008. Hawksbill nesting in Venezuela: Communication personnelle. In « *Rapport SWOT – L'état des tortues marines dans le monde* », vol. 3 (2008). **(2)** Guada, H. J., and G. Solé. 2000. *WIDECAST Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Venezuela*. Informe Técnico del PAC No. 39. Kingston, Jamaica: United Nations Environment Programme Caribbean Environment Programme.
Plages de nidification : Plages sur la côte caribéenne
Commentaires : Les données de ponte de 2006 ne sont pas disponibles. Des inventaires importants de la fin des années 1980 ont montré que les tortues imbriquées pondaient (en quantité indéterminée) sur plusieurs plages. D'autres études effectuées à la fin des années 1990 et récemment ont révélé des une activité de ponte parcellaires dans d'autres zones. Les sites de nidification des tortues imbriquées ont été relevés dans les États et dépendances fédérales suivants du Venezuela : Estado Anzoátegui, Estado Aragua, Estado Falcón, Estado Miranda, Estado Sucre, Estado Vargas, Isla de Aves et Isla La Blanquilla.
Contact de SWOT : Hedelvy Guada

VIETNAM

Relevé 109

Source de données : Hamann, M., The Cuong, C., Duy Hong, N., Thuoc, P., and B. Thi Thuhien. 2006. Distribution and abundance of marine turtles in the Socialist Republic of Viet Nam. *Biodiversity and Conservation* 15: 3703–20.
Plages de nidification : Golfe de Thaïlande, golfe de Tonkin et archipel de Spratly
Commentaires : Les données de 2006 ne sont pas disponibles. Des inventaires récents indiquent que moins de 10 nids étaient creusés chaque année au Vietnam.

YAP, ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

Relevé 110

Source de données : Cruce-Johnson, J. 2006. *Yap State Sea Turtle Conservation Program, Ulithi Tagging Project, Gielop and Iar islands, Summer 2005*. Yap State, Federated States of Micronesia: Marine Resources Management Division Report. Rapport non publié.
Plage de nidification : île de Gielop
Année : 2006 **Nombre :** 0 nid
Commentaires : Aucune observation de nidification de tortue imbriquée n'a été faite en 2006. En 2005, une tortue imbriquée nidificatrice a été observée et baguée sur l'île de Gielop. Des patrouilles de nuit ont été effectuées presque tous les soirs du 9 juin au 24 août 2005 et du 2 juin au 20 août 2006.
Contacts de SWOT : Jennifer Cruce et Wayne Sentman